

ツベラクチン筋注用 1g

【この薬は？】

販売名	ツベラクチン筋注用 1g Tuberactin Inj. 1g
一般名	エンビオマイシン硫酸塩 Enviomycin Sulfate
含有量 (1バイアル中)	1g (力価)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗結核剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、結核菌のタンパク合成を抑えることで、結核菌の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

<適応症>

肺結核及びその他の結核症

<適応菌種>

エンビオマイシンに感性の結核菌

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にツベラクチン筋注用に含まれる成分で過敏症のあった人。
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・ストレプトマイシン難聴またはその他の難聴の人または家族にストレプトマイシン難聴またはその他の難聴の人がいる人
 - ・アミノグリコシド系抗生物質（ストレプトマイシン、カナマイシン等）またはバシトラシンに対し過敏症のあった人
 - ・腎臓に障害のある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- ショック（冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失）やアナフィラキシー（全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい）があらわれることがあるので、過去に抗生物質でアレルギーがあった人や薬で過敏症のあった人は、医師に伝えてください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

- ・使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において筋肉内注射されます。
- 通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

	使用開始から 90 日間	使用開始から 91 日以降
1 日量	1g	1g
使用回数	毎日	1 週間に 2 日

- ・他の抗結核剤と併用されることがあります。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ショック（冷汗が出る、めまい、意識の消失、顔面蒼白、手足が冷たくなる）、アナフィラキシー（ふらつき、喉のかゆみ、動悸、息苦しい、全身のかゆみ、じんま疹）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。
- ・電解質異常があらわれることがあるので、この薬の使用中は、定期的に血液検査が行われます。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
第8脳神経障害 だいはちのうしんけいしょうがい	ふらつき、めまい、耳が聞こえにくい、耳鳴り、難聴
呼吸抑制 こきゅうよくせい	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる
血清電解質異常 けっせいでんかいしつじょう	体に力が入らない、体が動かせない、息苦しい、お腹が張る、指先や唇のしびれ、けいれん

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、けいれん、体に力が入らない、体が動かせない
頭部	めまい
耳	耳が聞こえにくい、耳鳴り、難聴
胸部	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる、息苦しい
腹部	お腹が張る
手・足	指先や唇のしびれ

【この薬の形は？】

性状	白色の塊状または粉末
形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	エンビオマイシン硫酸塩
------	-------------

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：旭化成ファーマ株式会社

(<https://www.asahikasei-pharma.co.jp>)

くすり相談窓口

電話：0120-114-936

受付時間：9時～17時45分（土日祝日、休業日を除く）