

# 患者向医薬品ガイド

2024年2月更新

## デカドロン注射液1.65mg

## デカドロン注射液3.3mg

## デカドロン注射液6.6mg

### 【この薬は？】

販売名	デカドロン注射液 1.65mg	デカドロン注射液 3.3mg	デカドロン注射液 6.6mg
一般名	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム Dexamethasone sodium phosphate		
含有量	1.65mg/0.5mL	3.3mg/1mL	6.6mg/2mL

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- この薬は、合成副腎皮質ホルモン剤（ステロイド）と呼ばれるグループに属する薬です。
- この薬は、炎症やアレルギー症状を改善、免疫の抑制などさまざまな働きがあり、多くの病気に用いられます。ただし、病気の原因そのものを治す薬ではありません。
- 次の病気の人に処方されます。

#### ○内分泌疾患

慢性副腎皮質機能不全（原発性、続発性、下垂体性、医原性）

**急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ）**

**副腎性器症候群**

**亜急性甲状腺炎**

**甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕**

**甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症**

**特発性低血糖症**

○リウマチ性疾患、結合織炎及び関節炎

**関節リウマチ**

**若年性関節リウマチ（スチル病を含む）**

**リウマチ熱（リウマチ性心炎を含む）**

**リウマチ性多発筋痛、強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）**

**強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）に伴う四肢関節炎**

**関節周囲炎（非感染性のものに限る）**

**腱炎（非感染性のものに限る）**

**腱鞘炎（非感染性のものに限る）**

**腱周囲炎（非感染性のものに限る）**

**滑液包炎（非感染性のものに限る）**

**変形性関節症（炎症症状がはっきり認められる場合）**

**非感染性慢性関節炎**

**痛風性関節炎**

○膠原病

**エリテマトーデス（全身性及び慢性円板状）**

**全身性血管炎（大動脈炎症候群、結節性動脈周囲炎、多発性動脈炎、ヴェガ  
ナ肉芽腫症を含む）**

**多発性筋炎（皮膚筋炎）**

**強皮症**

○腎疾患

**ネフローゼ及びネフローゼ症候群**

○心疾患

**うっ血性心不全**

○アレルギー性疾患

**気管支喘息**

**喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含む）**

**喘息発作重積状態**

薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹、中毒疹を含む）

血清病

アナフィラキシーショック

○血液疾患

紫斑病（血小板減少性及び血小板非減少性）

溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の疑われるもの）

白血病（急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病）  
(皮膚白血病を含む)

上記疾患のうち髄膜白血病

再生不良性貧血

凝固因子の障害による出血性素因

顆粒球減少症（本態性、続発性）

○消化器疾患

潰瘍性大腸炎

限局性腸炎

重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期、スプレーを含む）

○肝疾患

劇症肝炎（臨床的に重症とみなされるものを含む）

肝硬変（活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの）

○肺疾患

びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）

○重症感染症

重症感染症（化学療法と併用する）

○結核性疾患

結核性髄膜炎（抗結核剤と併用する）

結核性胸膜炎（抗結核剤と併用する）

○神経疾患

脳脊髄炎（脳炎、脊髄炎を含む）（但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること）

末梢神経炎（ギランバレー症候群を含む）

重症筋無力症

多発性硬化症（視束脊髄炎を含む）

小舞蹈病

顔面神経麻痺

脊髄蜘蛛網膜炎

## ○悪性腫瘍

悪性リンパ腫（リンパ肉腫症、細網肉腫症、ホジキン病、皮膚細網症、菌状  
息肉症）及び類似疾患（近縁疾患）

好酸性肉芽腫

乳癌の再発転移

## ○以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法

多発性骨髄腫

## ○抗悪性腫瘍剤（シスプラチンなど）投与に伴う消化器症状（恶心・嘔吐）

## ○外科疾患

副腎摘除

臓器・組織移植

侵襲後肺水腫

副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲

外科的ショック及び外科的ショック様状態

脳浮腫

輸血による副作用

気管支痙攣（術中）

蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）

手術後の腹膜癒着防止

## ○整形外科疾患

椎間板ヘルニアにおける神経根炎（根性坐骨神経痛を含む）

脊髓浮腫

## ○産婦人科疾患

卵管整形術後の癒着防止

## ○泌尿器科疾患

前立腺癌（他の療法が無効な場合）

陰茎硬結

## ○皮膚科疾患

\*湿疹・皮膚炎群（急性湿疹、亜急性湿疹、慢性湿疹、接触皮膚炎、貨幣状湿  
疹、自家感作性皮膚炎、アトピー皮膚炎、乳・幼・小児湿疹、ビダール苔癬、  
その他の神経皮膚炎、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、その他の手指の皮  
膚炎、陰部あるいは肛門湿疹、耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎、鼻前庭及び  
鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など）（但し、重症例以外は極力投与しないこと。  
局注は浸潤、苔癬化の著しい場合のみとする）

\*痒疹群（小児ストロフルス、蕁麻疹様苔癬、固定蕁麻疹を含む）（但し、重

症例に限る。また、固定尋麻疹は局注が望ましい)

尋麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る）

\*乾癬及び類症〔尋常性乾癬（重症例）乾癬性関節炎、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、稽留性肢端皮膚炎、疱疹状膿瘍疹、ライター症候群〕

\*掌蹠膿疱症（重症例に限る）

\*扁平苔癬（重症例に限る）

成年性浮腫性硬化症

紅斑症（\*多形滲出性紅斑、結節性紅斑）（但し、多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る）

粘膜皮膚眼症候群〔開口部びらん性外皮症、スチブンス・ジョンソン病、皮膚口内炎、フックス症候群、ベーチェット病（眼症状のない場合）、リップ・シュツ急性陰門潰瘍〕

\*円形脱毛症（悪性型に限る）

天疱瘡群（尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、Senear-Usher症候群、増殖性天疱瘡）

デューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡、妊娠性疱疹を含む）、帯状疱疹（重症例に限る）

\*紅皮症（ヘブラ紅色粒糠疹を含む）

\*早期ケロイド及びケロイド防止

新生児スクレーマ

## ○眼科疾患

内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜炎、網脈絡膜炎、網膜血管炎、視神経炎、眼窩炎性偽腫瘍、眼窩漏斗尖端部症候群、眼筋麻痺）

外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合（眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎）

眼科領域の術後炎症

## ○耳鼻咽喉科疾患

急性・慢性中耳炎

滲出性中耳炎・耳管狭窄症

メニエル病及びメニエル症候群

急性感音性難聴

血管運動（神經）性鼻炎

アレルギー性鼻炎

花粉症（枯草熱）

**副鼻腔炎・鼻茸**

**進行性壊疽性鼻炎**

**喉頭炎・喉頭浮腫**

**喉頭ポリープ・結節**

**食道の炎症（腐蝕性食道炎、直達鏡使用後）及び食道拡張術後**

**耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法**

**○歯科・口腔外科疾患**

**難治性口内炎及び舌炎（局所療法で治癒しないもの）**

**★：外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ない  
と推定される場合にのみ用いること**

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にデカドロン注射液に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）を夜間多尿による夜間頻尿に使用している男性
- ・次の薬を使用している人

〈本剤を全身に使用している人〉

ダクラタスビル塩酸塩（ダクルインザ）、アスナプレビル（スンベプラ）

〈本剤を全身に使用している人（一回だけ使用する場合を除く）〉

リルピビリン塩酸塩（エジュラント）、リルピビリン塩酸塩・テノホビル アラフェナミドマル酸塩・エムトリシタシン（オデフシイ）、ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩（ジャルカ）

○次の部位には、この薬を使用することはできません。

- ・感染症にかかっている関節腔内、滑液嚢内、腱鞘内または腱周囲
- ・動搖関節（関節が不安定な状態）の関節腔内

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・感染症にかかっている人
- ・全身の真菌症にかかっている人
- ・消化性潰瘍のある人
- ・精神病の人
- ・結核にかかっている人
- ・単純疱疹性角膜炎の人
- ・後嚢白内障の人
- ・緑内障の人
- ・高血圧の人
- ・電解質異常のある人
- ・血栓症の人
- ・最近、内臓の手術を受けた人
- ・急性心筋梗塞をおこした人
- ・糖尿病の人
- ・ウイルス性結膜・角膜疾患、結核性眼疾患、真菌性眼疾患および急性化膿性眼疾患のある人

- ・骨粗しょう症の人
- ・甲状腺機能が低下している人
- ・脂肪肝の人
- ・脂肪塞栓症の人
- ・重症筋無力症の人
- ・B型肝炎ウイルスキャリアの人
- ・薬物、食物、添加物等に過敏な喘息の人
- ・褐色細胞腫またはパラガンギリオーマのある人、およびその疑いのある人
- ・腎不全の人
- ・肝硬変の人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の

この薬には併用してはいけない薬〔デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿に使用している場合）、ダクラタスビル塩酸塩（ダクルインザ）、アスナプレビル（スンベプラ）、リルピビリン塩酸塩（エジュラント）、リルピビリン塩酸塩・テノホビル アラフェナミドフル酸塩・エムトリシタビン（オデフシイ）、ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩（ジャルカ）〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

### ● 使用量および回数

使う量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を連用した後、急に使用を中止すると、発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショックなどがあらわれることがあります。中止する場合は徐々に減量されます。
- ・この薬を眼科用に用いる場合には原則として2週間以上の長期使用は避けてください。
- ・この薬を長期あるいは大量に使用している間、または使用中止後6ヵ月以内は、免疫機能が低下していることがありますので、生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふく風邪、水痘（みずぼうそう）、BCGなど〕の接種を受けないでください。
- ・水痘または麻疹に感染すると致命的な経過をたどることがあります。感染が疑われる場合はただちに受診してください。

- ・この薬の連用により眼圧亢進、緑内障、後嚢白内障になることがあるので、定期的に検査を行うことがあります。
- ・リンパ系腫瘍のある人は、この薬の使用中に腫瘍崩壊症候群（意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ）があらわれることがあるので、血液検査や腎機能検査が行われることがあります。
- ・褐色細胞腫があることを認識していなかった状態でデキサメタゾン製剤（経口剤および注射剤）を使用した際に褐色細胞腫クリーゼが発現したとの報告があります。この薬の使用後に著しい血圧上昇、頭痛、動悸（どうき）などの症状があらわれた場合には、速やかに医師に相談してください。
- ・B型肝炎ウイルスキャリアの人には、この薬の使用中や使用終了後に継続して血液検査が行われます。
- ・強皮症の人は、この薬の使用で強皮症腎クリーゼがあらわれやすくなるとの報告があるので、使用中は血圧や腎機能検査が行われます。頭痛、むかむかする、嘔吐（おうと）、視力低下、けいれんなどの症状があらわれた場合には、速やかに医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
誘発感染症、感染症の増悪 ゆうはつかんせんしょう、かんせんしょう のぞうあく	発熱、寒気、体がだるい 〔B型肝炎ウイルスの増殖による肝炎としてあらわれる場合〕 体がだるい、吐き気、嘔吐、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる

続発性副腎皮質機能不全 ぞくはつせいふくじんひしつきのうふせん	体がだるい、意識の低下、意識の消失、嘔吐、食欲不振、発熱、冷汗が出る、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる
糖尿病 とうにょうびよう	体がだるい、体重が減る、喉が渴く、水を多く飲む、尿量が増える
消化性潰瘍 しょうかせいかいよう	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色ときに黒色）、腹痛、胃がむかむかする、黒い便が出る
消化管穿孔 しょうかんせんこう	吐き気、嘔吐、寒気、発熱、激しい腹痛、ふらつき、息切れ、意識の低下
膵炎 すいえん	強い腹痛、背中の痛み、お腹が張る、吐き気、嘔吐、体重が減る、喉が渴く、尿量が増える、皮膚が黄色くなる、油っぽい下痢が出る
精神変調 せいしんへんちょう	普段とは違う精神状態、幻覚、妄想、興奮抑うつ
うつ状態 うつじょうたい	気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、食欲不振、体がだるい
痙攣 けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
骨粗鬆症 こつそしょうじょう	骨折しやすい、腰・背中の痛み、手足の痛み、背が低くなった、背中が丸くなった
大腿骨及び上腕骨等の骨頭 無菌性壊死 だいたいこつおよびじょうわんこつのどこの こつとうむきんせいえし	脚の付け根の痛み、膝からももへの痛み、腕の付け根の痛み
ミオパシー	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋委縮
脊椎圧迫骨折 せきついあっぱくこっせつ	腰・背中の痛み、足のしびれ・脱力・まひ
長骨の病的骨折 ちゅうこつのびょうてきこっせつ	骨折した局所の痛みや腫れ、骨折しやすい
緑内障 りょくないしょう	目のかすみ、視力の低下、視野が欠けて狭くなる
後嚢白内障 こうのうはくないしょう	視力の低下、かすんで見える、まぶしい、眼鏡で視力が出ない
血栓塞栓症 けっせんそくせんじょう	吐き気、嘔吐、脱力、まひ、激しい頭痛、胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、激しい腹痛、お腹が張る、足の激しい痛み

喘息発作 ぜんそくほっさ	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする、息苦しい
腫瘍崩壊症候群 しゅようほうかいしょうこうぐん	意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき、発熱、寒気、体がだるい、体がかゆくなる、体重が減る、顔や手足の筋肉がぴくつく、骨折しやすい、背が低くなった、骨折した局所の痛みや腫れ、脱力、まひ
頭部	めまい、意識の消失、意識の低下、普段とは違う精神状態、幻覚、妄想、興奮抑うつ、気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、一時的にボーっとする、激しい頭痛
顔面	顔面蒼白
眼	白目が黄色くなる、目のかすみ、視力の低下、視野が欠けて狭くなる、かすんで見える、まぶしい、眼鏡で視力が出ない
口や喉	喉のかゆみ、吐き気、嘔吐、喉が渴く、水を多く飲む、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色ときに黒色）
胸部	動悸、息苦しい、息切れ、胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする

部位	自覚症状
腹部	食欲不振、上腹部痛、腹痛、胃がむかむかする、激しい腹痛、強い腹痛、お腹が張る
背中	背中の痛み、腰・背中の痛み、背中が丸くなつた
手・足	手足が冷たくなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、手足の痛み、脚の付け根の痛み、膝からももへの痛み、腕の付け根の痛み、足のしびれ・脱力・まひ、足の激しい痛み
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹、皮膚が黄色くなる
筋肉	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋萎縮
便	黒い便が出る、油っぽい下痢が出る
尿	尿の色が濃くなる、尿量が増える、尿量が減る

## 【この薬の形は？】

販売名	デカドロン注射液 1.65mL	デカドロン注射液 3.3mL	デカドロン注射液 6.6mL
性状	無色透明の水性注射剤		
形状			

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	デキサメタゾン
添加剤	亜硫酸水素ナトリウム、クレアチニン、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、クエン酸ナトリウム水和物、水酸化ナトリウム

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：サンドファーマ株式会社 (<https://www.sandoz.jp/>)

販売会社：サンド株式会社 (<https://www.sandoz.jp/>)

カスタマーケアグループ 0120-982-001

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日、当社休日を除く）