

オラビ錠口腔用 50mg

【この薬は？】

販売名	オラビ錠口腔用 50mg ORAVI Mucoadhesive Tablets 50mg
一般名	ミコナゾール Miconazole
含有量 (1 錠中)	日局 ミコナゾール 50mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、口腔咽頭カンジダ症治療剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、カンジダ菌（カビの一種）の細胞膜成分の合成を妨げることにより、カンジダ菌の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

カンジダ属による口腔咽頭カンジダ症

- ・この薬は、症状がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。医師の指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にオラビ錠口腔用に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・次の薬剤を使用中の人：ワルファリンカリウム（ワーファリン）、ピモジド（オーラップ）、キニジン硫酸塩水和物（キニジン硫酸塩）、トリアゾラム（ハルシオン）、シンバスタチン（リポバス）、アゼルニジピン（カルブロック）、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン（レザルタス配合錠）、ニソルジピン、ブロナンセリン（ロナセン）、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン配合錠）、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、リバーロキサバン（イグザレルト）、アスナプレビル（スンベプラ）、ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッド）、ルラシドン塩酸塩（ラツーダ）
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・スルホニル尿素系血糖降下剤（グリベンクラミド、グリクラジド、アセトヘキサミドなど）を使用している人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】


この薬は、犬歯の上部にある歯ぐきのくぼみに付着させて使う薬です。



●使用量および回数

通常、成人は1回1錠を1日1回使用します。

この薬の使用期間は、原則14日間とされています。

●どのように使用するか？

	乾いた手でボトルから薬を取り出し、「L」の印がある面を下にして指においてください。
---	--

	「L」の印のない曲面を犬歯の上部にある歯ぐきのくぼみ（犬歯窩（けんしか））に付着させます。決して飲み込んだり、なめたり、かみ砕いたりしないでください。
	付着後、上唇の上から指で30秒ほど軽く押さえて、しっかり付着させてください。その後、数分間は舌で薬を触らないようにしてください。薬はいったん付着したら、徐々に溶解するので、そのままにしてください。
	次に使用する場合は、反対側の犬歯窩（けんしか）に付着させて使用してください。もし、前回につけた薬が残っていたら、取り除いてから使用してください。

●はがれた場合や飲み込んだ場合の対応

- ・薬が付着しないか、最初に付着させてから6時間たたないうちに薬がはがれたら、はがれた薬をもう一度同じ位置に付着させてください。付着させられないときは、新たな薬を使用してください。
- ・最初に付着させてから6時間たたないうちに飲み込んだ場合は、コップ一杯の水を飲んでから、一度だけ新たな薬を使用してください。
- ・最初に付着させてから6時間たった後に薬がはがれたり、薬を飲み込んだりした場合は、翌日まで新たな薬を使用しないでください。

●使用し忘れた場合の対応

決して2回分を一度に使用しないでください。

気がついたときに、1回分を使用してください。ただし、次の使用する時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を使用してください。

●多く使用した時（過量投与時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・スルホニル尿素系血糖降下剤を併用する場合は、血糖値や低血糖症状（お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下）に注意し、低血糖症状があらわれたら医師または薬剤師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・通常通り飲食しても構いませんが、ガムをかむ等、この薬が取れてしまうおそれのある行為はしないでください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

形状	片側が曲面の錠剤	
		
直径	8mm	
厚さ	2.3mm	
重さ	115mg	
色	白色～微黄色	
識別コード	L	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ミコナゾール
添加物	ヒプロメロース、濃縮乳タンパク質、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・湿度の影響を受けやすいので、使用のたびにキャップをしっかり締め、直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。

- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ネクセラファーマジャパン株式会社

販売会社：久光製薬株式会社 (<https://www.hisamitsu.co.jp/>)

お客様相談室

TEL 0120-381332

受付時間／9：00－17：50（土日・祝日・会社休日を除く）