

イノベロン錠 100mg
イノベロン錠 200mg

【この薬は？】

販売名	イノベロン錠 100mg Inovelon Tablets 100mg	イノベロン錠 200mg Inovelon Tablets 200mg
一般名	ルフィナミド Rufinamide	
含有量	1錠中	
	100mg	200mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は脳内の神経の過剰な興奮をはずめて、てんかん発作を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない Lennox-Gastaut 症候群（レノックス・ガストー症候群）における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療法*

*この薬は、他の抗てんかん薬と併用されます。

- ・この薬は、体調がよくなったと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にイノベロン錠に含まれる成分やトリアゾール誘導体に対して過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・他の抗てんかん薬でアレルギーを起こしたことがある人または発疹があらわれたことがある人
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・先天性 QT 短縮症候群の人
 - ・高齢の人
- 先天性 QT 短縮症候群の人では、この薬を使用する前や使用している間に心電図の検査が行われることがあります。
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

		4歳以上の小児	4歳以上の小児及び成人		
体重		15.0～30.0kg	30.1～50.0kg	50.1～70.0kg	70.1kg以上
1 日 量	飲み始め 1・2日目	200mg	400mg		
	飲み始め3 日目以降	2日間毎に200mg 以下ずつ漸増	2日間毎に400mg以下ずつ漸増		
	維持用量	1000mg	1800mg	2400mg	3200mg
飲む回数		1日2回（食後、およそ30分以内に飲んでください）			

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時点で次に飲むまで6時間以上あったらすぐに1回分を飲んでください。6時間以内の場合には飲まないで1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、ただちに医師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・この薬により、てんかん重積状態*を起すことがあります。てんかん重積状態が起こった場合には、医師に相談してください。

(*てんかん重積状態：てんかん発作をくりかえし、なかなか回復しない状態)

- ・この薬により、発疹や発熱があらわれたらただちに医師に連絡してください。
- ・この薬を急に減らしたり、使用を中止したりすると、てんかん発作が悪化したり、てんかん重積状態が起こることがあります。そのため、この薬の使用を中止する場合には、時間をかけて、少しずつ量を減らしてゆきます。医師の指示どおりに使用してください。
- ・この薬で、眠気がおこったり、注意力・集中力・反射運動の能力などが低下することがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳中の方は、授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。


このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
薬剤性過敏症候群 やくざいせいかびんしょうしょうこうぐん	さむけ、ふらつき、汗がたくさん出る、発熱、意識がうすれる、考えがまとまらない、息苦しい、かゆみ、発疹、しびれ、判断力の低下
皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん（ステイブンス・ジョンソンしょうこうぐん）	からだがだるい、高熱、発熱、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、陰部の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、高熱、発熱、さむけ、ふらつき、汗がたくさん出る
頭部	意識がうすれる、考えがまとまらない
眼	まぶたや眼の充血、結膜のただれ
口や喉	ひどい口内炎、唇や口内のただれ
胸部	息苦しい
腹部	食欲不振
皮膚	かゆみ、発疹、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点
その他	しびれ、判断力の低下、陰部の痛み

【この薬の形は？】

販売名	イノベロン錠 100mg Inovelon Tablets 100mg	イノベロン錠 200mg Inovelon Tablets 200mg
PTP シート		
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 
長径 (mm)	10.2	15.2
短径 (mm)	5.4	6.2
厚さ (mm)	4.0	4.5
重さ (mg)	187	374
色	淡赤色	淡赤色
識別コード	E 261	E 262

【この薬に含まれているのは？】

販売名	イノベロン錠 100mg	イノベロン錠 200mg
有効成分	ルフィナミド	
添加物	クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒプロメロース、マクロゴール6000、ラウリル硫酸ナトリウム	クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸マグネシウム、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒプロメロース、マクロゴール6000、ラウリル硫酸ナトリウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：エーザイ株式会社(<http://www.eisai.co.jp/>)

hhc ホットライン

電話：フリーダイヤル 0120-419-497

受付時間：9時～18時（月～金）9時～17時（土、日、祝日）