

デエビゴ錠 2.5 mg デエビゴ錠 5 mg デエビゴ錠 10 mg

【この薬は？】

販売名	デエビゴ錠 2.5 mg Dayvigo Tablets 2.5mg	デエビゴ錠 5 mg Dayvigo Tablets 5mg	デエビゴ錠 10 mg Dayvigo Tablets 10mg
一般名	レンボレキサント Lemborexant		
含有量 (1錠中)	2.5mg	5mg	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、不眠症治療薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、覚醒を一時的に抑えることで、睡眠を促します。
- ・次の病気の人に処方されます。

不眠症

- ・この薬は、自己判断して使用を中止したり、量を増やしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・ 過去にデエビゴ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・ 肝臓に重度の障害がある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・ ナルコレプシー又はカタプレキシーのある人
 - ・ 肝臓に軽度及び中等度の障害がある人
 - ・ 腎臓に重度の障害がある人
 - ・ 脳に器質的な障害のある人
 - ・ 呼吸機能に中等度及び重度の障害がある人
 - ・ 妊娠または妊娠している可能性のある人
 - ・ 授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

● 使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

1 回量	5 mg
回数	1 日 1 回 就寝直前

- ・ 1 回 10mg を超えて飲まないでください。
 - ・ この薬は、寝るしたくをすませてから就寝の直前に飲むようにしてください。
 - ・ この薬を服用後、いったん寝たあと、短時間後にまた起きて、仕事などをする必要があるときは飲まないでください。
 - ・ イトラコナゾール、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、フルコナゾール、ベラパミルなどの薬剤と併用する際には、1 日 1 回 2.5mg 錠（1 錠）が処方されることがあります。
- ### ● どのように飲むか？
- ・ コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
 - ・ この薬の効果が遅くなる可能性があるため、この薬は、食事と同時または食事のすぐあとに飲まないでください。
- ### ● 飲み忘れた場合の対応
- ・ 決して 2 回分を一度に飲まないでください。翌晩の就寝時に通常どおりの量を飲むことができます。
- ### ● 多く使用した時（過量使用時）の対応
- ・ 誤って多く飲んだ場合、傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、筋緊張低下、光視症（視野の隅に稲妻のような光が走る）、低酸素症（息苦しい、唇が青紫色になる、手足の指先が青紫色になる、意識の低下、意識の消失、動悸）、初期不眠症、冷感（手足が冷たくなる、血色が悪い）などがあらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬の影響が次の朝以後におよび、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、この薬の使用中は自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- ・ この薬をイトラコナゾール、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、フルコナゾール、ベラパミルなどの薬と併用した場合、傾眠（刺激がないと眠ってしまう）などの副作用があらわれやすくなる場合があります。何か症状があらわれたら、医師または薬剤師に相談してください。
- ・ アルコール飲料は、この薬に影響しますので控えてください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。
- ・ 高齢の人では、この薬の作用が強くあらわれることがあります。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	デエビゴ錠 2.5mg Dayvigo Tablets 2.5mg	デエビゴ錠 5mg Dayvigo Tablets 5mg	デエビゴ錠 10mg Dayvigo Tablets 10mg
PTP シート			
形状	フィルムコーティング錠  	フィルムコーティング錠  	フィルムコーティング錠  
直径(mm)	7.1	7.1	7.1
厚さ(mm)	3.3	3.3	3.3
重さ(mg)	127	127	127
色	淡赤色	微黄色	橙色
識別コード	LEM 2.5	LEM 5	LEM 10

【この薬に含まれているのは？】

販売名	デエビゴ錠 2.5mg	デエビゴ 5mg	デエビゴ 10mg
有効成分	レンボレキサント		
添加物	酸化チタン，三二酸化鉄，ステアリン酸マグネシウム，タルク，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，乳糖水和物，ヒドロキシプロピルセルロース，ヒプロメロース，マクロゴール 6000	黄色三二酸化鉄，酸化チタン，ステアリン酸マグネシウム，タルク，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，乳糖水和物，ヒドロキシプロピルセルロース，ヒプロメロース，マクロゴール 6000	黄色三二酸化鉄，酸化チタン，三二酸化鉄，ステアリン酸マグネシウム，タルク，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，乳糖水和物，ヒドロキシプロピルセルロース，ヒプロメロース，マクロゴール 6000

【その他】

● この薬の保管方法は？

- ・ 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

● 薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社： エーザイ株式会社(<https://www.eisai.co.jp/>)

hhc ホットライン

電話：フリーダイヤル 0120-151-454

受付時間：9時～18時（月～金）

9時～17時（土、日、祝日）