

ラベキュアパック 400

ラベキュアパック 800

【この薬は？】

販売名	ラベキュアパック 400、ラベキュアパック 800 Rabecure PACK400、Rabecure PACK800
-----	--

この薬は以下の3つの薬（パリエット錠10mg、サワシリン錠250、クラリス錠200）を組み合わせたものです。

ラベキュアパック 400、ラベキュアパック 800

販売名	パリエット錠10mg Pariet Tablets 10mg	サワシリン錠250 Sawacillin Tablets 250	クラリス錠200 Clarith tab. 200
一般名	ラベプラゾール ナトリウム Rabeprazole Sodium	アモキシシリン 水和物 Amoxicillin Hydrate	クラリスロマイシン Clarithromycin
含有量（1錠中）	10mg	250mg（力価）	200mg（力価）

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・パリエット錠は、プロトンポンプ阻害剤と呼ばれるグループに属する薬で、胃の中で酸分泌を抑えます。
- ・サワシリン錠は、ペニシリン系抗生物質と呼ばれるグループに属する薬で、殺菌的な抗菌作用を示します。
- ・クラリス錠は、マクロライド系抗生物質と呼ばれるグループに属する薬で、静菌的あるいは殺菌的な抗菌作用を示します。
- ・サワシリン錠とクラリス錠は、ヘリコバクター・ピロリ菌を殺菌する作用があります。パリエット錠は胃酸の分泌を抑えることで、サワシリン錠とクラリス錠の抗菌作用を高めると考えられています。
- ・次の病気の人に処方されます。

【適応症】

胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 MALT リンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎

【適応菌種】

アモキシシリン、クラリスロマイシンに感性のヘリコバクター・ピロリ

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にパリエット錠、サワシリン錠、クラリス錠に含まれる成分に対して過敏症のあった人
- ・アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩、ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、スボレキサント、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル〔アドシルカ（肺動脈性肺高血圧症治療薬）〕、チカグレロル、イブルチニブ、アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩、イバブラジン塩酸塩、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）、ルラシドン塩酸塩、アナモレリン塩酸塩を使用している人
- ・肝臓又は腎臓に障害があり、コルヒチンを使用している人
- ・伝染性単核症にかかっている人
- ・腎臓に高度な障害がある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【パリエット錠】

- ・過去に薬剤で過敏症のあった人
- ・肝臓に障害のある人

【サワシリン錠】

- ・過去にペニシリン系又はセフェム系抗生物質で過敏症のあった人
- ・本人または両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質の人がいる人
- ・経口による摂取ができない人、経口以外の方法で栄養を摂取している人、全身状態の悪い人

【クラリス錠】

- ・過去に他のマクロライド系薬剤に対して過敏症のあった人
- ・心疾患のある人
- ・低カリウム血症の人
- ・腎臓に障害のある人
- ・肝臓に障害のある人

○この薬には併用してはいけない薬[アタザナビル硫酸塩（レイアタツ）、リルピビリン塩酸塩（エジュラント）、ピモジド（オーラップ）、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン）、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、スボレキサント（ベルソムラ）、ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッド）、タダラフィル（アドシルカ（肺動脈性肺高血圧症治療薬））、チカグレロロール（ブリリント）、イブルチニブ（イムブルビカ）、アスナプレビル（スンベプラ）、ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩（ジメンシー）、イバブラジン塩酸塩（コララン）、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）（ベネクレクタ）、ルラシドン塩酸塩（ラツータ）、アナモレリン塩酸塩（エドルミズ）] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の場合、この薬の使用前に、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることが確認されます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

3つの薬を同時に飲んで下さい。

ラベキュアパック 400

一回量	パリエット錠 10mg	1錠
	サワシリン錠 250	3錠
	クラリス錠 200	1錠
飲む回数	1日2回	

飲む期間	7日間
------	-----

ラベキュアパック 800

一回量	パリエット錠 10mg	1錠
	サワシリン錠 250	3錠
	クラリス錠 200	2錠
飲む回数	1日2回	
飲む期間	7日間	

●**どのように飲むか？**

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●**飲み忘れた場合の対応**

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。

●**多く使用した時（過量使用時）の対応**

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

【パリエット錠】

- ・この薬の使用中に血液検査が行われることがあります。

【サワシリン錠】

- ・ショック（冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失）、アナフィラキシー、アレルギー反応に伴う急性冠症候群があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・顆粒球減少、血小板減少があらわれることがあるので、定期的に検査が行われることがあります。
- ・黄疸、AST、ALTの上昇等があらわれることがあるので、定期的に検査が行われることがあります。
- ・腎臓に障害があらわれることがあるので、定期的に検査が行われることがあります。

【クラリス錠】

- ・血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症があらわれることがあるので、定期的に血液検査が行われることがあります。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

【パリエット錠】

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい
汎血球減少 はんけつきゅうげんしょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
中毒性表皮壊死融解症（TEN） ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう（テン）	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん（ステイブンス・ジョンソンしょうこうぐん）	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する

重大な副作用	主な自覚症状
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節や喉の痛み
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
間質性腎炎 かんしつせいじんえん	発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐（おうと）、下痢、腹痛、むくみ、尿量が減る
低ナトリウム血症 ていナトリウムけっしょう	吐き気、頭痛、嘔吐、けいれん、意識の低下
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
視力障害 しりょくしょうがい	文字や形がみえにくい、視野の異常
錯乱状態 さくらんじょうたい	注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない

【サワシリン錠】

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
アレルギー反応に伴う急性冠症候群 アレルギーはんのうにともなうきゅうせい かんしょうこうぐん	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、胸を強く押さえつけられた感じ、あごの痛み、左腕の痛み、寒気、ふらつき、汗をかく、発熱、意識の低下、口唇周囲のはれ、かゆみ、じんま疹、発疹、喉のかゆみ、動悸
中毒性表皮壊死融解症（TEN） ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう （テン）	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん（スティー ブンス・ジョンソンしょうこうぐん）	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節や喉の痛み
急性汎発性発疹性膿疱症 きゅうせいはんぱつせいほうしんせい のうほうしょう	発熱、皮膚が広い範囲で赤くなる、ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る
紅皮症（剥脱性皮膚炎） こうひしょう（はくだつせいひふえん）	ほぼ全身の皮膚が発赤する、発熱をしばしば伴う、しばしばフケのようなものがはがれ落ちる、フケやかさぶたのようなものを付着し、それがはがれ落ちる

重大な副作用	主な自覚症状
顆粒球減少 かりゅうきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
肝障害 かんしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
重篤な腎障害 じゅうとくなじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい、高血圧
重篤な大腸炎（偽膜性大腸炎、出血性大腸炎） じゅうとくなだいちょうえん（ぎまくせいだいちょうえん、しゅつけつせいだいちょうえん）	お腹が張る、腹痛、激しい腹痛、血が混ざった下痢、血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、発熱、頭痛、吐き気、冷汗が出る、顔面蒼白、ふらつき、息切れ、手足が冷たくなる、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色）、水のような便が出る
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
好酸球性肺炎 こうさんきゅうせいはいえん	発熱、咳、息切れ、息苦しい
無菌性髄膜炎 むきんせいずいまくえん	発熱、吐き気、頭痛、うなじがこわばり固くなって首を前に曲げにくい

【クラリス錠】

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
QT 延長 キューティーえんちょう	めまい、動悸、気を失う
心室頻拍（Torsade de pointes を含む） しんしつひんぱく（トルサード ド ポワント をふくむ）	めまい、動悸、胸の不快感、気を失う
心室細動 しんしつさいどう	気を失う
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振

重大な副作用	主な自覚症状
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
肝不全 かんふぜん	意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
汎血球減少 はんけつきゅうげんしょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
中毒性表皮壊死融解症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう (テン)	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) ひふねんまくがんしょうこうぐん (スティーブンス・ジョンソンしょうこうぐん)	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節や喉の痛み
PIE 症候群 ピーアイイーしょうこうぐん	発熱、咳、息切れ、息苦しい
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
偽膜性大腸炎 ぎまくせいだいちょうえん	腹痛、血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、発熱、頭痛、吐き気、冷汗が出る、顔面蒼白、手足が冷たくなる
出血性大腸炎 しゅっけつせいだいちょうえん	激しい腹痛、血が混ざった下痢、発熱、ふらつき、息切れ
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
痙攣 けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい


重大な副作用	主な自覚症状
尿細管間質性腎炎 にょうさいかんかんしつせいじんえん	発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、むくみ、尿量が減る
IgA 血管炎 アイジーエーけっかんえん	皮下出血によるあざ、関節痛、腹痛、血尿
薬剤性過敏症症候群 やくざいせいかびんしょうしょうこうぐん	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれ


以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。




	パリエット錠	サワシリン錠	クラリス錠
部位	自覚症状	自覚症状	自覚症状
全身	冷汗が出る、発熱、ふらつき、出血が止まりにくい、突然の高熱、寒気、出血しやすい、体がだるい、けいれん、脱力感、むくみ、体がかゆくなる、疲れやすい、力が入らない、急激に体重が増える	冷汗が出る、汗をかき、発熱、発熱をしばしば伴う、ふらつき、出血が止まりにくい、突然の高熱、寒気、むくみ、体がだるい、体がかゆくなる、疲れやすい、力が入らない	冷汗が出る、発熱、ふらつき、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれ、出血が止まりにくい、突然の高熱、寒気、出血しやすい、顔や手足の筋肉がびくつく、脱力感、むくみ、体がかゆくなる、疲れやすい、力が入らない、急激に体重が増える
頭部	めまい、意識の消失、頭痛、意識の低下、注意力が散漫になる、問いかげに間違った答えをする、行動にまとまりがない、急な意識の低下	めまい、意識の低下、意識の消失、しばしばフケのようなものはがれ落ちる、頭痛、うなじがこわばり固くなって首を前に曲げにくい	めまい、意識の消失、気を失う、頭痛、一時的にボーっとする、意識の低下、急な意識の低下
顔面	顔面蒼白、鼻血	顔面蒼白、鼻血、あごの痛み	顔面蒼白、鼻血
眼	目の充血やただれ、白目が黄色くなる、文字や形がみえにくい、視野の異常	目の充血やただれ、白目が黄色くなる	目の充血やただれ、白目が黄色くなる
耳	耳鳴り		耳鳴り
口や喉	咳、唇や口内のただれ、喉のかゆみ、歯ぐきの出血、喉の痛み、吐き気、嘔吐、血を吐く	咳、唇や口内のただれ、口唇周囲のはれ、喉のかゆみ、歯ぐきの出血、喉の痛み、吐き気	咳、吐き気、唇や口内のただれ、喉のかゆみ、歯ぐきの出血、喉の痛み、嘔吐、血を吐く
胸部	息切れ、息苦しい、動悸	息切れ、息苦しい、動悸、しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ	息切れ、息苦しい、動悸、胸の不快感
腹部	腹痛、食欲不振、お腹が張る	腹痛、激しい腹痛、食欲不振、お腹が張る	腹痛、激しい腹痛、食欲不振、お腹が張る

	パリエット錠	サワシリン錠	クラリス錠
手・足	手足が冷たくなる、関節や喉の痛み、手足のこわばり、手足のしびれ、関節の痛み	手足が冷たくなる、関節や喉の痛み、左腕の痛み	手足が冷たくなる、関節や喉の痛み、関節痛、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、手足のこわばり、手足のしびれ、関節の痛み
皮膚	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただれ、全身のかゆみ、じんま疹、あおあざができる、皮膚が黄色くなる、発疹	皮膚が広い範囲で赤くなる、ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る、ほぼ全身の皮膚が発赤する、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただれ、全身のかゆみ、かゆみ、発疹、じんま疹、あおあざができる、皮膚が黄色くなる、フケやかさぶたのようなものを付着し、それがはがれ落ちる	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただれ、全身のかゆみ、じんま疹、皮下出血によるあざ、あおあざができる、皮膚が黄色くなる、発疹
筋肉	筋肉の痛み		筋肉の痛み
尿	尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる、尿量が減る	尿量が減る、尿の色が濃くなる	血尿、尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる、尿量が減る
便	下痢、便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	血が混ざった下痢、ゆるい便が出る、血の混ざったゆるい便が出る、便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)、水のような便が出る	血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、血が混ざった下痢、下痢、便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)
その他		高血圧	

【この薬の形は？】

<p>販売名</p> <p>PTP シート</p>	<p style="text-align: center;">ラベキュアパック 400</p>  <p>ラベキュアパック400</p> <p>朝 夕</p> <p>1回分(3種類5錠)です。 1日2回(朝・夕)7日間続けて服用してください。</p> <p>主治医の指示どおり、のみ続けることが重要です。</p> <p>〈服用中の注意点〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●軟便、軽い下痢、または味覚異常がおきた場合 自分の判断でお薬を減らす、最後までのみ続け てください。症状がひどくなった場合は、主治医 または薬剤師に相談してください。 ●発熱や腹痛を伴う下痢、または便に血が混じる場合 直ちに服用を中止し、主治医または薬剤師に連絡 してください。 ●その他、気になる症状がある場合は、主治医また は薬剤師に相談してください。 <p>ラベキュアパック400</p> <p>製造販売元 エーザイ株式会社 販売元 EAファーマ株式会社</p>
-------------------------------	---

<p>販売名</p> <p>PTP シート</p>	<p style="text-align: center;">ラベキュアパック 800</p>  <p>ラベキュアパック800</p> <p>朝 夕</p> <p>1回分(3種類6錠)です。 1日2回(朝・夕)7日間続けて服用してください。</p> <p>主治医の指示どおり、のみ続けることが重要です。</p> <p>〈服用中の注意点〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●軟便、軽い下痢、または味覚異常がおきた場合 自分の判断でお薬を減らす、最後までのみ続け てください。症状がひどくなった場合は、主治医 または薬剤師に相談してください。 ●発熱や腹痛を伴う下痢、または便に血が混じる場合 直ちに服用を中止し、主治医または薬剤師に連絡 してください。 ●その他、気になる症状がある場合は、主治医また は薬剤師に相談してください。 <p>ラベキュアパック800</p> <p>製造販売元 エーザイ株式会社 販売元 EAファーマ株式会社</p>
-------------------------------	--

各 薬剤名	パリエット錠 10mg	サワシリン錠 250	クラリス錠 200
形状	フィルムコーティング錠（腸溶錠） 	素錠 	フィルムコーティング錠 
直径	6.7 mm	10.0 mm	8.6 mm
厚さ	3.6 mm	4.7 mm	5.4 mm
重さ	132 mg	380 mg	250 mg
色	淡黄色	うすいだいだい色	白色
識別 コード	E パリエット 10	250 SAW	クラリス 200

【この薬に含まれているのは？】

販売名	パリエット錠 10mg	サワシリン錠 250	クラリス錠 200
有効成分	ラベプラゾール ナトリウム	アモキシシリン 水和物	クラリスロマイシン
添加剤	エチルセルロース、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ、カルメロースカルシウム、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、酸化マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、D-マンニトール	白糖、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、サッカリンナトリウム水和物、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、香料、デキストリン、黄色5号アルミニウムレーキ	デンプングリコール酸ナトリウム、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カルナウバロウ、パラフィン、ショ糖脂肪酸エステル、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ヒプロメロース、酸化チタン、軽質無水ケイ酸

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。
製造販売会社：エーザイ株式会社

販売会社：EA ファーマ株式会社

(<https://www.eapharma.co.jp/>)

くすり相談室

電話：0120-917-719

受付時間：9時～17時30分（月～金）

9時～17時（土、日、祝日）