

## プレバイミス錠 240mg

### 【この薬は？】

販売名	プレバイミス錠 240mg PREVYMIS Tablets 240mg
一般名	レテルモビル Letermovir
含有量 (1錠中)	240mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗サイトメガロウイルス化学療法剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、サイトメガロウイルスの増殖に必要なウイルスのたんぱく質（DNAターミナーゼ複合体）を阻害して抗ウイルス作用を示します。
- ・次の目的で処方されます。

#### **同種造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制**

- ・この薬は、自己判断で使用を中止したり量を加減したりすると、本来の効果が得られないおそれがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にこの薬に含まれる成分で過敏症のあった人
  - ・次の薬を使用している人  
ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、メチルエルゴメトリン、エルゴメトリン
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・肝臓に重い障害がある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬 [ピモジド (オーラップ)、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン (クリアミン配合錠)、ジヒドロエルゴタミン、メチルエルゴメトリン (パルタンM)、エルゴメトリン] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて医師が決めます。

通常、成人では、1日1回2錠を飲みます。

シクロスポリン（免疫抑制剤）と併用する場合には1日1回1錠を飲みます。

移植当日から移植後28日以内を目安に開始し、使用期間は、サイトメガロウイルス感染症の発症リスクを考慮しながら、移植後200日目まで使用することが目安となります。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、すぐに1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は、1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊娠する可能性のある人は胎児に悪影響を及ぼす可能性があることを十分理解できるまで説明を受けるとともに、使用中および使用終了後一定期間は適切な避妊をしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 【この薬の形は？】

形状	楕円形のフィルムコーティング錠 
PTP シート	
長径	16.5mm
短径	8.5mm
厚さ	5.2mm
重さ	618mg
色	黄色
識別コード	 591

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	レテルモビル
添加剤	結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、乳糖水和物、トリアセチン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・PTP シートのまま保管し、服用直前に PTP シートから取り出してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD 株式会社 (<https://www.msd.co.jp>)

MSD カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9:00～17:30

（土日祝日・製造販売会社休日を除く）