

## エドルミズ錠 50mg

### 【この薬は？】

販売名	エドルミズ錠 50mg ADLUMIZ Tablets 50mg
一般名	アナモレリン塩酸塩 Anamorelin Hydrochloride
含有量 (1錠中)	アナモレリン塩酸塩として50mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、「がん悪液質」の症状（食欲不振や体重減少）を改善する薬です。
- ・この薬は、脳の食欲中枢に作用し、食欲を増進させます。また、脳下垂体に作用し、成長ホルモンの分泌を高めます。その結果、筋肉が作られ、体重が増えます。
- ・次のような人に処方されます。

下記の悪性腫瘍におけるがん悪液質

非小細胞肺癌、胃癌、膵癌、大腸癌

ただし、口からの食事が難しい又は食事の消化吸収不良の人には処方されません。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○患者さんまたは家族の方は、この薬の効果や注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明を理解したことを確認した場合に使用が開始されます。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にエドルミズ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・うっ血性心不全のある人
- ・心筋梗塞または狭心症のある人
- ・高度の刺激伝導系障害（完全房室ブロックなど）のある人
- ・クラリスロマイシン、イトラコナゾール、ボリコナゾール、リトナビル含有製剤、コビシスタット含有製剤、エンシトレルビル フマル酸を使用している人
- ・肝臓に中等度以上の障害（Child-Pugh分類BおよびC）がある人
- ・消化管閉塞など、消化管の器質的な異常で口からの食事が難しい人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・基礎心疾患（弁膜症、心筋症など）のある人
- ・過去に心筋梗塞または狭心症になったことのある人
- ・刺激伝導系障害（房室ブロック、洞房ブロック、脚ブロックなど）のある人
- ・QT間隔延長のおそれまたは過去になったことがある人
- ・電解質に異常（低カリウム血症、低マグネシウム血症、低カルシウム血症）がある人
- ・過去にアントラサイクリン系抗がん剤を使用したことがある人
- ・肝臓に軽い障害（Child-Pugh分類A）がある人
- ・糖尿病の人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬や、併用に注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

〔併用してはいけない薬〕

クラリスロマイシン（クラリシッド）、イトラコナゾール（イトリゾール）、ボリコナゾール（ブイフェンド）、リトナビル含有製剤（ノービア）、コビシスタット含有製剤（ゲンボイヤ、プレジコビックス、シムツーザ）、エンシトレルビル フマル酸（ゾコーバ）

○この薬の使用前に心電図、脈拍、血圧、心胸比、電解質、血糖値、尿糖、肝機能の

検査が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

通常、成人の飲む量および回数、飲み方は、次のとおりです。

1回量	2錠（100mg）
飲む回数	1日1回
飲み方	<p><u>空腹時に飲み、その後1時間は食事をしない。</u></p> <p>〔例：起床時に飲む場合〕 <u>起床直後に飲み、1時間たってから朝食をとる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 一般に起床直後は、空腹と考えられます。</li><li>・ 就寝直前など、食べてから数時間では、食べたものがお腹に残っていることがあるので、注意が必要です。</li></ul>

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

次の飲む時間に1回分を飲んでください。

### ●多く使用したとき（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬には刺激伝導系（心臓の拍動を調節するしくみ）を抑える作用があります。この薬を使用中に、検査で心電図の異常（顕著なPR間隔またはQRS幅の延長、QT間隔の延長など）がみられたり、めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れなどがあらわれたら、すみやかに医師に相談してください。この薬を飲み始めたばかりの頃は特に注意をしてください。投与期間中は定期的に、心電図、脈拍、血圧、心胸比、電解質等の検査が行われます。
- ・ この薬は糖尿病の悪化や高血糖をおこすことがあります。この薬を使用中に体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増えるなどの症状があらわれたら、すみやかに医師に相談してください。投与期間中は定期的に、血糖値や尿糖の検査が行われます。

- ・この薬は肝臓に障害をおこすことがあります。この薬を使用中に、疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振などの症状があらわれたら、すみやかに医師に相談してください。なお、投与期間中は定期的に、肝機能検査が行われます。
- ・飲み始めてから3週間たっても、この薬の効果があらわれないと感じたときは、医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。
- ・グレープフルーツジュース、セイヨウオトギリソウを含有する食品はこの薬に影響しますので、控えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
刺激伝導系抑制 しげきでんどうけいよくせい	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
高血糖 こうけつとう	体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増える
糖尿病の悪化 とうによびょうのあつか	
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部 位	自覚症状
全身	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、体重が減る
頭部	めまい、気を失う、立ちくらみ
口や喉	喉が渇く、水を多く飲む、吐き気
胸部	息切れ

腹部	食欲不振
手・足	脈が遅くなる
尿	尿量が増える

## 【この薬の形は？】

外形	 エドルミズ 50
形状	錠剤(フィルムコーティング錠)
長径	14.1 mm
短径	6.6 mm
厚さ	5.2 mm
質量	364 mg
色	薄い黄色
識別コード	エドルミズ 50

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アナモレリン塩酸塩
添加剤	ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、黄色三二酸化鉄、その他4成分

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：小野薬品工業株式会社 (<https://www.ono-pharma.com/>)

くすり相談室

電話：0120-886-336

受付時間：9時～17時（土日・  
祝日・会社休業日を除く）

本剤はHelsinn Healthcare SAに許諾されたライセンスに従って小野薬品工業株式会社が製造販売する。