

ラジレス錠 150mg

【この薬は？】

販売名	ラジレス錠 150mg Rasilez Tablets 150mg
一般名	アリスキレンフマル酸塩 Aliskiren Fumarate
含有量 (1錠中)	165.75mg (アリスキレンとして150mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、直接的レニン阻害剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、血圧調節などに重要な働きをするレニン-アンジオテンシン系の酵素のレニンに作用し、血圧上昇の原因となるアンジオテンシンの産生を低下させて血圧を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。

高血圧症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にラジレス錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・イトラコナゾール、シクロスポリンを使用している人
- ・アンジオテンシン変換酵素阻害剤（ACE 阻害剤）、又はアンジオテンシンII受容体拮抗剤（ARB）を使用している糖尿病の人（ただし、ACE 阻害剤、又は ARB を使用し、その他の血圧を下げる治療を並行して行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の人を除く）
- ・サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物を使用している糖尿病の人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・体液量又は塩分が明らかに減少している人（例えば、血液透析中の人、高用量の利尿剤の投与を受けている人、重度な減塩療法中の人）
- ・腎動脈狭窄のある人
- ・高カリウム血症の人
- ・腎臓に障害がある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

[併用してはいけない薬]

イトラコナゾール（イトリゾールなど）

シクロスポリン（サンディミュン、ネオーラルなど）

[糖尿病の人が併用してはいけない薬]

アンジオテンシン変換酵素阻害剤：

カプトプリル（カプトリル）、エナラプリル（レニベース）、アラセプリル（セタプリル）、イミダプリル塩酸塩（タナトリル）、キナプリル塩酸塩（コナン）、シラザプリル水和物（シラザプリル）、テモカプリル塩酸塩（エースコール）、デラプリル塩酸塩（アデカット）、トランドラプリル（オドリック）、ベナゼプリル塩酸塩（チバセン）、ペリンドプリルエルブミン（コバシル）、リシノプリル水和物（ゼストリル、ロンゲス）など（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）

アンジオテンシン II 受容体拮抗剤：

バルサルタン（ディオバン）、アジルサルタン（アジルバ）、オルメサルタン（オルメテック）、イルベサルタン（アバプロ、イルベタン）、カンデサルタン（プロプレス）、テルミサルタン（ミカルディス）、ロサルタン（ニューロタン）など（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬：

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	150mg
飲む回数	1日1回

- ・この薬は食後に飲むか、食前（空腹時）に飲むかによって血中濃度が変化します。血中濃度を一定に保つため、毎日決まった時に飲みます。医師の指示で、朝か昼か夕食か、食前か食後か、が決まったら、原則としてそれを変えないでください。
- ・1回 150mg を服用しても効果不十分な場合には1回 300mg まで増量されることがあります。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

決めてある朝、昼、晩にかかわらず、次の食事の時に飲みます。ただし、その食事の前か後かは、決めてあるとおりにしてください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

低血圧（めまい、ふらつき、立ちくらみ、頭痛、頭が重い、体がだるい、力が入らない）があらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。

- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使うことができません。
- ・ この薬を使用中に妊娠が判明した場合や妊娠が疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続）は、速やかに医師に相談してください。
- ・ 妊娠する可能性がある人は、医師や薬剤師に、この薬が妊婦や胎児に影響を及ぼす可能性があることについて説明を受け、十分に理解してください。特に、妊娠の希望や予定のある人は、医師に相談してください。
- ・ この薬の使用前及び使用中も定期的に医師や薬剤師が妊娠していないことを確認します。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。薬の影響を心配する女性に対し、妊娠と薬情報センターで相談に応じています。さらに詳しい説明を希望される場合には妊娠と薬情報センターにご相談ください。
 《妊娠と薬情報センター》
 （国立成育医療研究センター） 電話：03-5494-7845

- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
血管浮腫 けっかんふしゅ	唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる、喉がつまる感じ、息苦しい、声が出にくい
アナフィラキシー アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
高カリウム血症 こうカリウムけっしょう	体のしびれ、体に力が入らない、吐き気、嘔吐、下痢、お腹が張る
腎機能障害 じんきのうしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体のしびれ、ふらつき、体に力が入らない、むくみ、体がだるい
顔面	唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる
口や喉	喉がつまる感じ、声が出にくい、喉のかゆみ、吐き気、嘔吐
胸部	動悸、息苦しい
腹部	お腹が張る
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹
便	下痢
尿	尿量が減る

【この薬の形は？】

形状	円形のフィルムコート剤 
----	---

	
直径	11.2mm
厚さ	4.1mm
重さ	357mg
色	うすい赤色
識別コード	NVR IL

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アリスキレンフマル酸塩
添加剤	ポビドン、クロスポビドン、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄、酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・この薬を飲む時までは包装を開けずに保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：株式会社オーファンパシフィック

(<http://www.orphanpacific.com/index.html>)

DIセンター

電話番号：0120-889-009

受付時間：9：00～17：30（土・日・祝日・社休日を除く）