

ブフェニール錠 500mg、ブフェニール顆粒 94%

【この薬は？】

販売名	ブフェニール錠 500mg Buphenyl Tablets 500mg	ブフェニール顆粒 94% Buphenyl Granules 94%
一般名	フェニル酪酸ナトリウム Sodium Phenylbutyrate	
含有量	500mg (1 錠中)	940mg (1g 中)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、尿素サイクル異常症用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、アンモニアを尿と一緒に体の外へ排出することでアンモニアの増加を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

尿素サイクル異常症

- ・この薬は、十分な栄養管理のもとに使用する必要がありますので、食事について説明を受けてください。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にブフェニールに含まれる成分で過敏症を経験したことがある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・うっ血性心不全の人、浮腫を伴うナトリウム貯留が認められる人
- ・先天性の β 酸化異常のある人
- ・腎不全の人、腎臓に障害がある人
- ・肝臓に障害がある人
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの体表面積（身長と体重から計算）や体重、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

販売名	ブフェニール錠 500mg・ブフェニール顆粒 94%	
対象	体重 20kg 未満の人	体重 20kg 以上の人
一日量	フェニル酪酸ナトリウムとして体重 1 kg あたり 450～600mg	フェニル酪酸ナトリウムとして体表面積 1 m ² あたり 9.9～13.0g
飲む回数	1 日 3 回～6 回	

●どのように飲むか？

食事のタイミングにあわせて、食事とともに飲むか、もしくは食直後に飲んでください。患者が乳児の場合は授乳のタイミングに合わせて授乳の直後に飲ませてください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

下痢、神経過敏症（軽い刺激に対する過度の反応）、代謝性アシドーシス（頭痛、眠くなる、意識の低下、深く大きい呼吸など）を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・風邪、激しい運動、食事および便秘などによって、体内のアンモニアが増加することがあります。嘔吐、手足のふるえ、意識の低下などの症状があらわれた

場合には、ただちに受診してください。

- ・血清カリウム値が低下することがありますので血液検査が行われます。
また、治療効果を確認するためにも血液検査が行われます。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	ブフェニール錠 500mg	ブフェニール顆粒 94%
形状	楕円形の錠剤 	
直径	16mm	—
厚さ	6.7mm	—
重さ	675mg	—
色	白色～微帯黄白色	白色～微帯黄白色
識別コード	U C Y 500	—

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ブフェニール錠500mg	ブフェニール顆粒94%
有効成分	フェニル酪酸ナトリウム	
添加剤	結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム	軽質無水ケイ酸、ステアリン酸カルシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：株式会社オーファンパシフィック

(<http://www.orphanpacific.com/index.html>)

D I センター

電話番号：0120-889-009

受付時間：9：00～17：30（土・日・祝日・社休日を除く）