

オラデオカプセル 150mg

【この薬は？】

販売名	オラデオカプセル 150mg ORLADEYO Capsules 150mg
一般名	ベロトラルスタット塩酸塩 Berotralstat Hydrochloride
含有量 (1カプセル中)	172.5mg (ベロトラルスタットとして150mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、血漿カリクレイン阻害剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、血漿カリクレインと呼ばれる物質の働きを妨げることで、遺伝性血管性浮腫（からだのあらゆる部位に起こる突然の腫れやむくみ）の急性発作の発症を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 患者さんやその家族の方は以下の点について十分理解できるまで説明を受けてください。理解したことが確認されてから使用が開始されます。
 - ・この薬は、急性発作が起こった時にその治療のために服用するものではありません。
 - ・この薬は、QT延長を含めて特に注意すべき副作用があります。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にオラデオカプセルに含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・心電図でQT延長がある人、または過去にあった人、QT延長を起こしやすい患者（不整脈、虚血性心疾患、低カリウム血症など）のある人
 - ・肝臓に中等度または重度の障害のある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

通常、成人と12歳以上の小児の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	1カプセル
飲む回数	1日1回

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時すぐに、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。1日に2回以上飲んではいけません。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・QT延長があらわれることがありますので、心電図検査が行われることがあります。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のう

ち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
 このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
QT延長 キューティーえんちょう	めまい、動悸（どうき）、気を失う

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
 これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	疲れやすい、体がだるい、力が入らない
頭部	めまい、気を失う
口や喉	吐き気
胸部	動悸
腹部	食欲不振

【この薬の形は？】

形状	硬カプセル 
直径	19mm
厚さ	7mm
重さ	322mg
色	キャップ：青 ボディ：白
識別コード	B C X150

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ベロトラルスタット塩酸塩
添加物	部分アルファー化デンプン、クロスポビドン、軟質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム カプセル本体：ゼラチン、酸化チタン、青色2号

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

提携：バイオクリスト・ジャパン 株式会社

電話：03-4216-8260

製造販売元：株式会社 オーファンパシフィック

販売提携：鳥居薬品 株式会社