

エブトール 125mg 錠 エブトール 250mg 錠

【この薬は？】

販売名	エブトール 125mg 錠 Ebutol 125mg Tablets	エブトール 250mg 錠 Ebutol 250mg Tablets
一般名	エタンブトール塩酸塩 Ethambutol Hydrochloride	
含有量 (1錠中)	125mg	250mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗結核剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は結核菌の核酸合成経路を抑えることで、結核菌の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

〈適応症〉

肺結核及びその他の結核症、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症

〈適応菌種〉

本剤に感性のマイコバクテリウム属

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にエブトール錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・視神経炎のある人
 - ・糖尿病の人
 - ・アルコール中毒の人
 - ・腎臓に障害がある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の使用前に視力検査等の眼の検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量、飲む回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔肺結核及びその他の結核症〕

販売名	エブトール 125mg 錠		エブトール 250mg 錠	
1 回量	6～8 錠	3～4 錠	3～4 錠	2 錠
飲む回数	1 日 1 回(朝食後)	1 日 2 回(朝夕)	1 日 1 回(朝食後)	1 日 2 回(朝夕)

- ・他の抗結核剤と併用されることがあります。

〔MAC 症を含む非結核性抗酸菌症〕

販売名	エブトール 125mg 錠	エブトール 250mg 錠
1 回量	4～6 錠	2～3 錠
飲む回数	1 日 1 回(朝食後)	1 日 1 回(朝食後)

- ・1 日量として 1g (125mg 錠なら 8 錠、250mg 錠なら 4 錠) を超えて使用されることはありません。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用により、視力障害（物が見えない、物が見えにくい、視力の低下）があらわれることがありますので、早期発見の為、定期的に視力検査等が行われます。
- ・この薬を使用中に、霧がかかったように見える、かすむ、物の形が見えにくい、新聞が見づらい、黒ずんで見える、色調が変わって見えるなどの症状があらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。特に高齢者であらわれやすいので注意してください。
- ・重篤な肝障害がおこることがあるので定期的に肝機能検査が行われます。
- ・血小板減少がおこることがあるので定期的に血液検査が行われます。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
視力障害 しりよくしょうがい	文字や形がみえにくい、視野の異常
重篤な肝障害 じゅうとくなかんしょうがい	体がだるい、吐き気、食欲不振、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）、意識の低下
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
好酸球性肺炎 こうさんきゅうせいはいえん	発熱、咳、息切れ、息苦しい
中毒性表皮壊死融解症（TEN） ちゅうどくせいひょうひえし ゆうかいしょう（テン）	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス ジョンソン症候群） ひふねんまくがんしょうこう ぐん（スティーブンスジョン ソンしょうこうぐん）	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する

重大な副作用	主な自覚症状
紅皮症（剥脱性皮膚炎） こうひしょう（はくだつせいひふえん）	ほぼ全身の皮膚が発赤する、発熱をしばしば伴う、しばしばフケのようなものがはがれ落ちる、フケやかさぶたのようなものを付着し、それがはがれ落ちる
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、体がかゆくなる、急激に体重が増える、冷汗が出る、ふらつき、発熱、発熱をしばしば伴う、出血が止まりにくい
頭部	意識の低下、めまい、意識の消失、しばしばフケのようなものがはがれ落ちる
顔面	顔面蒼白（そうはく）、鼻血
眼	文字や形がみえにくい、視野の異常、白目が黄色くなる、目の充血やただれ
口や喉	吐き気、血を吐く、喉のかゆみ、咳、唇や口内のただれ、歯ぐきからの出血
胸部	動悸（どうき）、息苦しい、息切れ
腹部	食欲不振、お腹が張る
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	皮膚が黄色くなる、全身のかゆみ、じんま疹、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、ほぼ全身の皮膚が発赤する、あおあざができる、フケやかさぶたのようなものを付着し、それがはがれ落ちる
便	便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

販売名	エブトール 125mg 錠			エブトール 250mg 錠		
	表	裏	側面	表	裏	側面
形状						
直径	8.2mm			10.2mm		
厚さ	4.6mm			6.1mm		
重さ	195mg			387mg		
色	淡黄色			淡黄色		
識別コード	KC12			KC11		

【この薬に含まれているのは？】

販売名	エブトール 125mg 錠	エブトール 250mg 錠
有効成分	日局エタンプトール塩酸塩	
添加物	結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール6000、黄色三二酸化鉄	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社 科研製薬株式会社 (<https://www.kaken.co.jp/>)

医薬品情報サービス室

電話番号：0120-519-874

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）