

サビーン点滴静注用 500mg

【この薬は？】

| | |
|---------------------|--|
| 販売名 | サビーン点滴静注用 500mg SAVENE for Intravenous Infusion 500mg |
| 一般名 | デクスラゾキサン Dexrazoxane |
| 含有量 (1バイアル 中) | デクスラゾキサン 500mg |

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている電子添文を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に電子添文情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、解毒剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、アントラサイクリン系と呼ばれる抗がん剤が血管外に漏れ出たときに起こる、皮膚の腫れ、水ぶくれ、壊死などを抑える薬です。
- ・次の目的で、医療機関で使用されます。

アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にサビーン点滴静注用に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
- ・腎臓に障害のある人
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・妊娠する可能性がある人、パートナーが妊娠する可能性がある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用方法は、あなたの年齢、症状、体表面積（身長や体重から計算）などにあわせて医師が決め、医療機関において注射されます。

通常、成人の使用する量、期間および時間は、次のとおりです。

| | 1 回量 | 最高使用量 | 使用時間 |
|------|---------------------------------|---------|----------------------------|
| 初日 | 1000mg/m ² (体表面積) | 2000 mg | 1～2 時間かけて点滴静注します。 |
| 2 日目 | | | 初日と同じ時刻に 1～2 時間かけて点滴静注します。 |
| 3 日目 | 500mg/m ² (体表面積) | 1000 mg | |

- ・中等度および高度の腎臓に障害のある人は、通常の半量で使用されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用後や使用後に、骨髄抑制（白血球減少、好中球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少など）があらわれることがあるため、定期的に血液検査が行われます。骨髄抑制の症状（「副作用は？」の表を参照）があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ・この薬を使用している間は生ワクチン [麻疹 (はしか)、風疹 (ふうしん)、おたふく風邪、水痘 (みずぼうそう)、BCG、ポリオ (小児マヒ) など] の接種はできません。接種の必要がある場合には医師に相談してください。
- ・生殖可能な年齢の人にこの薬を使用する場合には、性腺に対する影響を考慮して使用されます。
- ・本人あるいはパートナーの方がこの薬を使用している間および使用を中止した後少なくとも 3 ヶ月間は、妊娠しないよう確実に避妊をしてください。また、この薬を使用している間および使用を中止した後少なくとも 3 ヶ月間に妊娠がわかった場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|--|---|
| 骨髄抑制 (白血球減少、好中球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少) こつぜいよくせい (はつけきゅうげんしょう、こうちゅうきゅうげんしょう、けっしょうばんげんしょう、へもぐるびんげんしょう) | 発熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い、動悸(どうき)、息切れ、突然の高熱、体がだるい、めまい、頭痛、耳鳴り |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位 | 自覚症状 |
|-----|-----------------------------|
| 全身 | 体がだるい、発熱、突然の高熱、寒気、出血が止まりにくい |
| 頭部 | めまい、頭が重い、頭痛 |
| 顔面 | 鼻血 |
| 耳 | 耳鳴り |
| 口や喉 | 喉の痛み、歯ぐきの出血 |
| 胸部 | 動悸、息切れ |
| 皮膚 | あおあざができる |

【この薬の形は？】

| | |
|-----|--|
| 販売名 | サベーン点滴静注用 500mg |
| 性状 | 白色～帯黄白色の塊または粉末 (凍結乾燥製剤) |
| 形状 | バイアル製剤  |

【この薬に含まれているのは？】

| | |
|------|-----------------|
| 販売名 | サビーン点滴静注用 500mg |
| 有効成分 | デクスラゾキサソ |

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：キッセイ薬品工業株式会社 (<https://www.kissei.co.jp/>)

くすり相談センター

フリーダイヤル：0120-007-622

受付時間：9時～17時40分（土日祝日・当社休日を除く）