患者向医薬品ガイド

2025年4月更新

ダルベポエチン　アルファ注5μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注10μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注15μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注20μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注30μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注40μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注60μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注120μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ注180μｇシリンジ「ＫＫＦ」

【この薬は？】

一般名
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） Darbepoetin Alfa (Genetical Recombination)

販売名	含有量 （１シリンジ中）
ダルベポエチン アルファ注５μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION ５μｇ SYRINGE「KKF」	５μｇ
ダルベポエチン アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION １０μｇ SYRINGE「KKF」	１０μｇ
ダルベポエチン アルファ注 １５μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION １５μｇ SYRINGE「KKF」	１５μｇ
ダルベポエチン アルファ注 ２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION ２０μｇ SYRINGE「KKF」	２０μｇ
ダルベポエチン アルファ注 ３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION ３０μｇ SYRINGE「KKF」	３０μｇ
ダルベポエチン アルファ注 ４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION ４０μｇ SYRINGE「KKF」	４０μｇ
ダルベポエチン アルファ注 ６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION ６０μｇ SYRINGE「KKF」	６０μｇ

ダルベポエチン アルファ注 １２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION １２０μｇ SYRINGE「KKF」	１２０μｇ
ダルベポエチン アルファ注 １８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 Darbepoetin Alfa INJECTION １８０μｇ SYRINGE「KKF」	１８０μｇ

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は、持続型赤血球造血刺激因子製剤と呼ばれるグループに属する薬です。
・この薬は、骨髄中で赤血球のもとになる細胞を刺激して、赤血球を増やします。
・次の病気の人に、医療機関において使用されます。

腎性貧血
骨髄異形成症候群に伴う貧血

［腎性貧血、骨髄異形成症候群に伴う貧血］
・この薬は、貧血症に伴う日常生活活動の支障が認められる患者さんに使用します。

［腎性貧血］
・他の貧血症（失血性貧血、汎血球減少症等）の人には、この薬を使用することができません。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

〇次の人は、この薬を使用することはできません。
・過去にダルベポエチン　アルファ注シリンジ「ＫＫＦ」に含まれる成分またはエリスロポエチン製剤で過敏症のあった人

〇次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
・心筋梗塞の人、肺梗塞の人、脳梗塞の人または過去にこれらの疾患になったことのある人

・高血圧の人
・過去に薬物で過敏症のあった人
・アレルギー素因がある人
・妊婦または妊娠している可能性のある人
・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

・この薬は注射薬です。
・使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて医師が決め、医療機関において静脈内または皮下に注射されます。

腎性貧血・血液透析患者に使用する場合
［成人の場合］

	初回量	維持量
使用量	１回２０μｇを１週に１回、静脈内に注射します。 エリスロポエチン製剤からの切替えの場合、１５～６０μｇを１週に１回、静脈内に注射します。	１回１５～６０μｇを１週に１回、または３０～１２０μｇを２週に１回、静脈内に注射します。
最高量	１回１８０μｇ	

［小児の場合］

	初回量	維持量
使用量	１回体重１ｋｇあたり０．３３μｇを１週に１回、静脈内に注射します。	１回５～６０μｇを１週に１回、または１回１０～１２０μｇを２週に１回、静脈内に注射します。
最高量	１回２０μｇ	１回１８０μｇ

腎性貧血・腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病患者に使用する場合
［成人の場合］

	初回量	維持量
使用量	１回３０μｇを２週に１回、皮下または静脈内に注射します。 エリスロポエチン製剤からの切替えの場合、１回３０～１２０μｇを２週に１回、皮下または静脈内に注射します。	１回３０～１２０μｇを２週に１回、または１回６０～１８０μｇを４週に１回、皮下または静脈内に注射します。
最高量	１回１８０μｇ	

［小児の場合］

	初回量	維持量
使用量	１回体重１ｋｇあたり０．５μｇを２週に１回、皮下または静脈内に注射します。（最高３０μｇ） エリスロポエチン製剤からの切替え	１回５～１２０μｇを２週に１回、または１回１０～１８０μｇを４週に１回、皮下または静脈内に注射します。

	の場合、１回１０～６０μｇを２週に１回、皮下または静脈内に注射します。	
最高量	１回１８０μｇ	

骨髄異形成症候群に伴う貧血に使用する場合
・通常、成人には１回２４０μｇを週１回、皮下に注射します。
・この薬と他の抗悪性腫瘍剤との併用投与での有効性および安全性は確立していません。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

［腎性貧血、骨髄異形成症候群に伴う貧血に共通する注意］
・この薬の使用により、血圧上昇、高血圧性脳症があらわれることがあります。
・この薬の使用により、抗エリスロポエチン抗体産生を伴う赤芽球癆（せきがきゅうろう）があらわれることがあります。
・この薬の効果発現には鉄の存在が重要です。鉄欠乏時には鉄剤が使われることがあります。
・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
・授乳している人は医師に相談してください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

［腎性貧血に対する注意］
・ヘモグロビン濃度やヘマトクリット値を測定するために定期的な血液検査が行われます。
・この薬を使用中に高カリウム血症（体のしびれ、体に力が入らない、吐き気、嘔吐（おうと）、下痢、お腹が張る）がおこることがあるので、食事によるカリウムの摂取に注意してください。

［骨髄異形成症候群に対する注意］
・ヘモグロビン濃度を測定するために定期的な血液検査が行われます。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
脳梗塞 のうこうそく	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしにくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる
脳出血 のうしゅっけつ	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしにくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉

	が出にくくなる
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
高血圧性脳症 こうけつあつせいのうしょう	頭痛、早朝の嘔吐、一時的な視力障害、片側のまひ、言葉が出にくい、けいれん
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい
赤芽球癆 せきがきゅうろう	体がだるい、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ
心筋梗塞 しんきんこうそく	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷汗が出る
肺梗塞 はいこうそく	発熱、血の混じった痰、胸の痛み、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	けいれん、ふらつき、体がかゆくなる、体がだるい、発熱、疲れやすい、片側のまひ、力が入らない、冷汗が出る、食欲不振
頭部	めまい、意識の消失、頭痛、突然のめまい、突然の意識の消失、突然の意識の低下、突然の頭痛
顔面	顔面蒼白
眼	一時的な視力障害、白目が黄色くなる
耳	耳鳴り
口や喉	血の混じった痰、言葉が出にくい、喉のかゆみ、早朝の嘔吐、吐き気、突然しゃべりにくくなる、突然の嘔吐、突然言葉が出にくくなる
胸部	しめ付けられるような胸の痛み、胸の痛み、息苦しい、息切れ、動悸
手・足	手足が冷たくなる、突然片側の手足が動かしにくくなる
皮膚	じんま疹、全身のかゆみ、皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

・性状：無色澄明の液

販売名	容器の形状
ダルベポエチン アルファ注 ５μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 １０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 １５μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 ２０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 ３０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 ４０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 ６０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 １２０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	
ダルベポエチン アルファ注 １８０μｇ シリンジ「ＫＫＦ」	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
添加剤	ポリソルベート８０、L-メチオニン、リン酸二水素ナトリウム水和物、等張化剤、pH 調節剤

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：協和キリンフロンティア株式会社

(https://www.kyowa-kirin-frontier.com/)

販売会社：協和キリン株式会社（https://www.kyowakirin.co.jp/）
くすり相談窓口
電話：０１２０－８５０－１５０
受付時間：９時～１７時
（土・日・祝日及び弊社休日を除く）