

グラアルファ配合点眼液

【この薬は？】

販売名	グラアルファ配合点眼液 GLA-ALPHA combination ophthalmic solution
一般名	リパスジル塩酸塩水和物／ブリモニジン酒石酸塩 Ripasudil Hydrochloride Hydrate/Brimonidine Tartrate
含有量 (1mL 中)	リパスジル塩酸塩水和物 4. 8 9 6 mg (リパスジルとして 4. 0 mg) ／ブリモニジン酒石酸塩 1. 0 mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、Rho キナーゼ阻害薬と α_2 -作動薬の2種類の薬を含む、緑内障・高眼圧症治療剤と呼ばれるグループに属する点眼薬です。
- ・ この薬に含まれるリパスジル塩酸塩水和物は、眼圧を調整する水分の排出を促進します。また、ブリモニジン酒石酸塩は、眼圧を調整する水分の産生を抑制するとともに排出を促進します。これらの作用により、眼圧を下げます。
- ・ 次の病気の人に処方されます。

緑内障、高眼圧症（他の緑内障治療薬が効果不十分な場合）

- ・ この薬は、症状がよくなったと自己判断して点眼を中止したり、点眼回数を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 過去にグラアルファ配合点眼液に含まれる成分で過敏症を経験したことがある人
- ・ 低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・ 脳血管障害、起立性低血圧のある人
- ・ 心血管系疾患のある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・ 授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は点眼薬です。

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、1回1滴、1日2回点眼します。

●どのように使用するか？

- ・ 点眼前によく手指を洗ってください。
- ・ 点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意してください。
- ・ 点眼後は1～5分間目を閉じて、目頭のあたりを軽くおさえてください。
- ・ この薬を使用後、他の点眼薬を使用する場合には、5分以上の間をあけてください。
- ・ ソフトコンタクトレンズをつけている場合には、点眼前にコンタクトレンズを外し、点眼後5分以上経過してからコンタクトレンズをつけてください。

●使用し忘れた場合の対応

- ・ 1回に2滴点眼したり、1日に指示された回数を超えて点眼しないでください。
- ・ その日のうちに気づいた場合は、すぐに1回1滴を点眼してください。ただし、次の点眼する時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回1滴を点眼してください。
- ・ 翌日に気づいた場合は、前日分は点眼せず、当日分の1回1滴1日2回を点眼してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・ 異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 重篤な副作用があらわれることがあるので、患者さんは正しい使用方法について十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・ この薬は点眼後、全身に吸収される可能性があり、 α_2 -作動剤の全身投与と同様の副作用として、眠気、めまい、徐脈（脈がとぶ、脈が遅くなる）、低血圧等があらわれることがあります。

- ・点眼後、一時的に眠気、めまいや目がかすむことがあるため、症状が回復するまで機械の操作や自動車の運転等をしないでください。
- ・角膜混濁があらわれることがあるので、定期的に受診してください。また、目の充血、視力の低下、目がかすむなどがあらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。この薬を使用する場合は、角膜混濁について、医師から十分に説明を受けてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
角膜混濁 かくまくこんだく	目のかすみ、物が見えにくい、まぶしい、視力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	目のかすみ、物が見えにくい、まぶしい、視力の低下

【この薬の形は？】

色	微黄緑色澄明
内容量	5mL
容器	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	リパスジル塩酸塩水和物、ブリモニジン酒石酸塩
添加剤	リン酸二水素ナトリウム、塩化ナトリウム、水酸化ナトリウム、濃ベンザルコニウム塩化物液50

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・ 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：興和株式会社 (<https://medical.kowa.co.jp/>)

くすり相談センター

電話：0120-508-514

03-3279-7587

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）