

ネイリンカプセル 100 mg

【この薬は？】

販売名	ネイリンカプセル 100 mg NAILIN Capsules 100 mg
一般名	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール 付加物 Fosravuconazole L-Lysine Ethanolate
含有量 (1カプセル中)	169.1 mg (ラブコナゾールとして 100 mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、トリアゾール系抗真菌薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、爪白癬の原因である真菌の細胞膜成分の合成に必要な酵素の作用を妨げることにより、真菌の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

〔適応症〕

爪白癬

〔適応菌種〕

皮膚糸状菌（トリコフィトン属）

- ・この薬は、爪白癬と確定診断された人にもみ使用されます。
- ・この薬は、一度変色した爪を回復させるものではありません。
- ・この薬は、症状がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にネイリンカプセルに含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使用する前にそのことを医師または薬剤師に教えてください。
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・ワルファリンを使用している人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、1日1回1カプセルを12週間飲みます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・肝機能障害があらわれることがありますので、肝機能検査が行われることがあります。
- ・同類薬（他のアゾール系抗真菌薬）をワルファリンと併用すると、ワルファリンの作用が増強し、出血の危険性が高くなった症例が報告されています。この薬を飲み始める前に、ワルファリンを使用している人は、そのことを医師に伝えてください。ワルファリンと併用する場合は、出血のしやすさを確認するため、血液検査の回数が増やされることがあります。
- ・必要に応じて、やすりや爪切り等で病変部の手入れをしてください。
- ・妊娠する可能性のある人は、この薬を使用している間および使用を中止してから少なくとも3ヵ月間は必ず避妊してください。
- ・授乳中の人は、授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談して


ください。

重大な副作用	主な自覚症状
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだのだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、皮膚が黄色くなる、かゆみ、尿の色が濃くなる
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節や喉の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだのだるい、発熱
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気、嘔吐
胸部	吐き気
腹部	吐き気、食欲不振
手・足	関節や喉の痛み
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

形状	
長径	15.6 mm
短径	5.8 mm
重さ	220.7 mg
色	キャップ部は赤色、ボディ部は黄色
識別コード	SATO 18

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物
添加物	酸化マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、ラウリル硫酸ナトリウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・この薬は吸湿性があるので、飲む直前にPTPシートから取り出してください。
- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。

- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：佐藤製薬株式会社

(<http://medinfo-sato.com/top.html>)

医薬事業部

フリーダイヤル：0120-310-656

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）