

クアゼパム錠 15mg 「サワイ」 クアゼパム錠 20mg 「サワイ」

【この薬は？】

販売名	クアゼパム錠 15mg 「サワイ」 QUAZEPAM Tablets 15mg [SAWAI]	クアゼパム錠 20mg 「サワイ」 QUAZEPAM Tablets 20mg [SAWAI]
一般名	クアゼパム Quazepam	
含有量 (1錠中)	15mg	20mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、睡眠障害改善剤で、ベンゾジアゼピン系と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳が興奮している状態をしずめ、寝つきをよくする働きがあります。
- ・次の病気の人に処方されます。

○不眠症

- ・次の目的で処方されます。

○麻酔前投薬

〔不眠症に使用する場合〕

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にクアゼパム錠「サワイ」に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・急性閉塞隅角緑内障の人
- ・重症筋無力症の人
- ・睡眠時無呼吸症候群の人
- ・リトナビルを使用している人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・肺性心（肺の疾患に基づく心臓の病気）、肺気腫、気管支喘息、脳血管障害の急性期などのため、呼吸機能が高度に低下している人
- ・衰弱している人
- ・心臓に障害のある人
- ・脳に器質的な障害のある人
- ・腎臓に障害がある人
- ・肝臓に障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬 [リトナビル（ノービア）] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。また、食事の後にこの薬を飲むと、この薬の効果が強くなる場合がありますので、食事の後にこの薬を飲むことは避けてください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔不眠症の場合〕

販売名	クアゼパム錠 15mg 「サワイ」	クアゼパム錠 20mg 「サワイ」
一回量	クアゼパムとして1回20mg	
飲む回数	1日1回就寝前	
1日最高量	30mg	

- ・この薬は、寝るしたくをすませてから就寝の直前に飲むようにしてください。
- ・この薬を飲んだ後、いったん寝て短時間の後にまた起きて仕事などをする必要があるときは、飲まないでください。

〔麻酔前投薬の場合〕

販売名	クアゼパム錠 15mg 「サワイ」	クアゼパム錠 20mg 「サワイ」
一回量	クアゼパムとして1回15～30mg	
飲む回数	1日1回就寝前（手術前夜）	
1日最高量	30mg	

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・異常を感じたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。過量使用の治療薬としてフルマゼニルがあります。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・食事の後にこの薬を飲むと、薬の吸収が良くなり、過度の鎮静や呼吸抑制を起こすおそれがあります。食事の後にこの薬を飲むことは避けてください。
- ・この薬の影響が次の朝以後におよび、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作をしないでください。
- ・この薬を続けて飲んでいくと、ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ないなど、薬物依存の症状があらわれることがあるので、長期間の使用は避けることとされています。このような症状があらわれたら、医師に連絡してください。また、この薬の量を急激に減らしたり、中止したりすることで、けいれん発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚（実際には存在しないものを存在するかのよう感じる）、妄想などの離脱症状があらわれることがあるので、この薬を中止する場合には、徐々に減量されます。この薬の飲む量や飲む期間については医師の指示に従ってください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
依存性 いぞんせい	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、手足のふるえ、発汗、幻覚、不眠
刺激興奮 しげきこうふん	口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器物を破壊する、些細なことで怒る
錯乱 さくらん	注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない
呼吸抑制 こきゅうよくせい	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる

重大な副作用	主な自覚症状
炭酸ガスナルコーシ ス たんさんガスナルコーシス	体がだるい、意識の低下、頭痛、息苦しい
精神症状(幻覚、妄想 等) せいしんしょうじょう(げんか く、もうそうなど)	実際には存在しないものを存在するかのようを感じる、 根拠が無いのに、あり得ないことを考えてしまう、論理 的な説得を受け入れようとしな
意識障害 いしきしょうがい	意識の低下、意識の消失
思考異常 しこういじょう	思考のまとまりがなくなる、思考が停止する、自分の意 思に反する思考が生じる、事実でないことをそうである と確信する
勃起障害 ぼつきしょうがい	性行為が可能なように陰茎が勃起しない
興奮 こうふん	口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器 物を破壊する、些細なことで怒る
運動失調 うんどうしつちょう	手足の動きがぎこちない、しゃべりにくい、ふらつき、 まっすぐ歩けない
運動機能低下 うんどうきのうていか	運動ができなくなる
協調異常 きょうちょういじょう	思っていると通りの動作ができない、複雑な動作ができ ない
言語障害 げんごしょうがい	しゃべりにくい、発語が不明瞭になる、言語による表現 や理解ができなくなる
振戦 しんせん	手足のふるえ、首のふるえ
一過性前向性健忘 いっかせいぜんこうせいけんぼ う	一時的に新しく記憶することができなくなる
もうろう状態 もうろうじょうたい	意識の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、発汗、運動ができなくなる、ふらつき、まっすぐ歩 けない、思っていると通りの動作ができない、複雑な動作ができ ない

部位	自覚症状
頭部	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、幻覚、不眠、口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器物を破壊する、些細なことで怒る、注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない、意識の低下、頭痛、実際には存在しないものを存在するかのように感じる、根拠が無いのに、あり得ないことを考えてしまう、論理的な説得を受け入れようとしめない、意識の消失、思考のまとまりがなくなる、思考が停止する、自分の意思に反する思考が生じる、事実でないことをそうであると確信する、言語による表現や理解ができなくなる、首のふるえ、一時的に新しく記憶することができなくなる
口や喉	しゃべりにくい、発語が不明瞭になる
胸部	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる、息苦しい
手・足	手足のふるえ、手足の動きがぎこちない
生殖器	性行為が可能なように陰茎が勃起しない

【この薬の形は？】

販売名	クアゼパム錠 15mg 「サワイ」	クアゼパム錠 20mg 「サワイ」
P T P シート		
形状	円形の錠剤 (割線入り) 	円形の錠剤 (割線入り) 
直径	8.5mm	9.0mm
厚さ	2.8mm	3.4mm
重さ	201mg	268mg
色	淡橙色	
識別コード	SW 7 5 1	SW 7 5 2

【この薬に含まれているのは？】

販売名	クアゼパム錠 15mg 「サワイ」	クアゼパム錠 20mg 「サワイ」
有効成分	クアゼパム	
添加剤	アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸ナトリウム、黄色5号、黄色5号アルミニウムレーキ	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：沢井製薬株式会社 (<https://www.sawai.co.jp>)

お客様相談室

電話番号：0120-373-381

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社休業日を除く）