

ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」
 ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」
 ブロムペリドール錠 6mg 「サワイ」
 ブロムペリドール細粒 1% 「サワイ」

【この薬は？】

販売名	ブロムペリドール 錠 1mg 「サワイ」 BROMPERIDOL Tablets 1mg [SAWAI]	ブロムペリドール 錠 3mg 「サワイ」 BROMPERIDOL Tablets 3mg [SAWAI]	ブロムペリドール 錠 6mg 「サワイ」 BROMPERIDOL Tablets 6mg [SAWAI]	ブロムペリドール 細粒 1% 「サワイ」 BROMPERIDOL Fine Granules 1% [SAWAI]
一般名	ブロムペリドール Bromperidol			
含有量	1錠中 1mg	1錠中 3mg	1錠中 6mg	1g中 10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・昏睡状態の人
- ・バルビツール酸誘導体などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
- ・重い心不全の人
- ・パーキンソン病の人またはレビー小体型認知症のある人
- ・過去にブロムペリドール錠「サワイ」またはブロムペリドール細粒「サワイ」に含まれる成分やブチロフェノン系化合物で過敏症のあった人
- ・アドレナリンを使用している人(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く)
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・心臓や血管の病気の人、低血圧の人、またはこれらが疑われている人
- ・QT延長をおこしやすい人(QT延長をおこすことが知られている薬剤を使用している人、低カリウム血症のある人など)
- ・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある人、または過去におこしたことがある人
- ・甲状腺機能亢進状態の人
- ・過去に薬剤で過敏症のあった人
- ・脱水の人や栄養状態の悪い人
- ・高温環境下にある人
- ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人
- ・肝臓に障害のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬 [アドレナリン (アナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く) (ボスミン)] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量は、次のとおりです。

販売名	ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」	ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」	ブロムペリドール錠 6mg 「サワイ」	ブロムペリドール細粒 1% 「サワイ」
1 日 量	通常量	3 ~ 18 mg		
	最高量	36 mg		

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

低血圧（脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失）、過度の鎮静（活動量や発話量が少なくなる、眠り込んでしまう）、重い錐体外路症状（動きが遅い、眼球が上を向く、首のねじれやつっぱり、手足のふるえやこわばり、筋肉のこわばり、足がそわそわして落ち着かない）、呼吸抑制（呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる）、低血圧を伴う昏睡状態（意識の消失、刺激に全く反応しない）、心電図異常などの症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・抗精神病薬を飲んでいる人には、肺塞栓症（胸の痛み、突然の息切れ）、静脈血栓症（皮膚が青紫～暗紫色になる、下肢のはれ、下肢のむくみ、下肢の痛み、下肢（もしくは、はれた部分）の熱感）などが報告されています。長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人は特にこれらの症状に注意してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
S y n d r o m e m a l i n (悪性症候 群) シンドローム マリン (あくせいしょうこうぐん)	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず囁むような口の動き、意思に反して体が動く

重大な副作用	主な自覚症状
抗利尿ホルモン不適 合分泌症候群 (S I A D H) こうりにょうホルモンふてきご うぶんびつしょうこうぐん (エスアイエイディエイチ)	けいれん、意識の低下、意識の消失、吐き気、食欲不振
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐(おうと)、お腹が張る
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
無顆粒球症 むかりゆうきゆうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゆうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせん しょう	皮膚が青紫～暗紫色になる、下肢のはれ、下肢のむくみ、下肢の痛み、下肢(もしくは、はれた部分)の熱感
心室頻拍 (T o r s a d e d e P o i n t e s を含む) しんしつひんぱく(トルサード ドポアントをふくむ)	めまい、動悸(どうき)、胸の不快感、気を失う

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、意思に反して体が動く、けいれん、脱力感、突然の高熱、寒気、食欲不振
頭部	ぼーっとする、意識の低下、意識の消失、めまい、気を失う
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、吐き気、嘔吐、喉の痛み
胸部	呼吸数が増える、胸の痛み、突然の息切れ、動悸、胸の不快感
腹部	お腹が張る
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、手足のこわばり、手足のしびれ、下肢のはれ、下肢のむくみ、下肢の痛み、下肢(もしくは、はれた部分)の熱感
皮膚	皮膚が青紫～暗紫色になる
筋肉	筋肉の痛み
便	便やおならが出にくい
尿	尿が赤褐色になる

部位	自覚症状
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」	ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」	ブロムペリドール錠 6mg 「サワイ」	ブロムペリドール細粒 1% 「サワイ」
PTPシート				—
形状	円形の錠剤 	円形の錠剤 	円形の錠剤 	細粒剤 
直径	6.0mm	6.0mm	7.0mm	—
厚さ	3.1mm	3.1mm	3.1mm	—
重さ	9.5mg	9.5mg	12.5mg	—
色	白色			白色
識別コード	SW 960	SW 961	SW 962	—

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ブロムペリドール錠 1mg 「サワイ」	ブロムペリドール錠 3mg 「サワイ」	ブロムペリドール錠 6mg 「サワイ」	ブロムペリドール細粒 1% 「サワイ」
有効成分	ブロムペリドール			
添加剤	結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン			軽質無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：沢井製薬株式会社 (<https://www.sawai.co.jp>)

お客様相談室

電話番号：0120-373-381

受付時間：9時～17時

(土、日、祝日、その他当社休業日を除く)