

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「サワイ」

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」

【この薬は？】

販売名	ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 25mg 「サワイ」 PILSICAINIDE HYDROCHLORIDE Capsules 25mg [SAWAI]	ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 50mg 「サワイ」 PILSICAINIDE HYDROCHLORIDE Capsules 50mg [SAWAI]
一般名	ピルシカイニド塩酸塩水和物 Pilsicainide Hydrochloride Hydrate	
含有量 (1カプセル中)	25mg	50mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、不整脈治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、心臓に作用し、心臓の異常な興奮を抑えて、脈の乱れを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合 頻脈性不整脈

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・うっ血性の心不全のある人
 - ・高度の房室ブロック、高度の洞房ブロックのある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・心筋梗塞、弁膜症、心筋症などの基礎心疾患のある人
 - ・心不全になったことのある人
 - ・刺激伝導障害（房室ブロック、洞房ブロック、脚ブロックなど）のある人
 - ・著明な洞性徐脈のある人
 - ・腎臓に障害のある人
 - ・肝臓に重篤な障害のある人
 - ・血液中のカリウム濃度が低い人
 - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

	通常量	最高量
一回量	50mg	75mg
飲む回数	1日3回	

透析が必要な腎不全の患者さんでは、1日 25mg から使用を開始することがあります。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

この薬を多く飲んでしまった場合や高度の腎機能の障害でこの薬の血中濃度が上がった場合に、意識がなくなる、からだがだるい、めまい、息切れ、冷や汗、脱力感などの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれたら、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用中は、定期的な心電図、脈拍、血圧、心胸比などの検査が行われます。特に次の患者さんは少量から使用が開始され、頻回に心電図が測定されます。
 - ・心筋梗塞、弁膜症、心筋症などの基礎心疾患のある人
 - ・高齢の人
 - ・他の不整脈治療薬を飲んでいる人
 - ・腎臓に障害のある人
- ・めまいなどがあらわれることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合には、十分に注意してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？



特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
心室細動 しんじつさいどう	気を失う
心室頻拍（トルサード ドポアントを含む） しんじつひんぱく（トルサード ドポアントをふくむ）	めまい、動悸（どうき）、胸の不快感、気を失う
洞停止 どうていし	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
完全房室ブロック かんぜんぼうしつブロック	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
失神 しっしん	短時間、意識を失い倒れる
心不全 しんふぜん	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	体がだるい、むくみ、尿量が減る
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	疲れやすい、むくみ、体重の増加、体がだるい、力が入らない
頭部	めまい、気を失う、立ちくらみ、短時間、意識を失い倒れる
口や喉	吐き気
胸部	息苦しい、息切れ、動悸、胸の不快感
腹部	食欲不振
手・足	脈が遅くなる
尿	尿量が減る

【この薬の形は？】

販売名	ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 25mg 「サワイ」	ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 50mg 「サワイ」
PTP シート		
形状	硬カプセル剤 	硬カプセル剤 
長さ	14.2mm	14.2mm
重さ	180mg	170mg
色	頭部：淡青色不透明 胴部：白色不透明	頭部：青色不透明 胴部：白色不透明
識別コード	SW-923	SW-924

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 25mg 「サワイ」	ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 50mg 「サワイ」
有効成分	ピルシカイニド塩酸塩水和物	
添加剤	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、青色1号	ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、青色1号

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：沢井製薬株式会社 (<https://www.sawai.co.jp>)

お客様相談室

電話番号：0120-373-381

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社休業日を除く）