

# 患者向医薬品ガイド

2008年7月更新

## スプラタストトシル酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」

### 【この薬は?】

販売名	スプラタストトシル酸塩カプセル 50mg 「サワイ」 Suplatast Tosilate Capsules 50mg 「SAWAI」	スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」 Suplatast Tosilate Capsules 100mg 「SAWAI」
一般名	スプラタストトシル酸塩 Suplatast Tosilate	
含有量 (1カプセル中)	50mg	100mg

### 患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は?】

- ・この薬は、アレルギー性疾患治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、アレルギーの原因となる物質や炎症を起こす物質の作用を抑え、アレルギー反応を抑制します。
- ・次の病気の人処方されます。

#### 気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎

- ・この薬は、体調がよくなつたと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にスプラタストトシル酸塩カプセル「サワイ」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・肝臓に障害のある人

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は次のとおりです。

販売名	スプラタストトシル酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」
一回量	2 カプセル	1 カプセル
飲む回数	1 日 3 回、毎食後	

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。飲み忘れた場合は、その回の使用を避けて、次の使用時間に1回分を飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は、喘息の症状が悪化した時ばかりでなく、良好にコントロールされている時も継続して飲んでください。
- ・この薬は、気管支拡張剤やステロイド剤とは異なり、すでに起こっている喘息の発作や症状を速やかに改善する薬ではありません。患者さんまたは家族の方は、正しい使用方法について十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれるることが一般的です。



このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
肝機能障害 かんきのうしょうがい	皮膚が黄色くなる、嘔吐（おうと）、白目が黄色くなる、尿が黄色い、吐き気、食欲不振、かゆみ、体がだるい
ネフローゼ症候群 ネフローゼしょうこうぐん	全身の著明なむくみ、尿量が減る

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	全身の著明なむくみ、体がだるい
眼	白目が黄色くなる
口や喉	嘔吐（おうと）、吐き気
胸部	吐き気
腹部	吐き気、食欲不振
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ
尿	尿量が減る、尿が黄色い

## 【この薬の形は？】

販売名	スプラタストトシル酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」
形状	硬カプセル剤 	硬カプセル剤 
長さ	14.2mm	15.8mm
重さ	115mg	216mg
色	白色不透明	白色不透明
識別コード	SW-148	SW-149

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	スプラタストトシル酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg 「サワイ」
有効成分	スプラタストトシル酸塩	
添加物	結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム	

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

### 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：沢井製薬株式会社 (<http://www.sawai.co.jp>)

くすり相談窓口

電話番号：0120-373-381

受付時間：9時～17時

(土、日、祝日、その他当社休業日を除く)