

リジュセアミニ点眼液 0.025%

【この薬は？】

販売名	リジュセアミニ点眼液 0.025% (RYJUSEA Mini ophthalmic solution)
一般名	アトロピン硫酸塩水和物 (Atropine Sulfate Hydrate)
含有量 (1mL 中)	0.25mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、近視進行抑制点眼剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、眼球の前後の長さが伸びるのを抑えることで、近視の進行を抑制することが期待できます。
- ・次の目的で処方されます。

近視の進行抑制

- ・この薬は、自己判断で使用を中止すると近視が急激に進行することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・緑内障のある人や、狭隅角や前房が浅いなどの眼圧上昇の素因のある人
- ・過去にリジュセアミニ点眼液 0.025%に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・授乳中の人

○この薬には併用に注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は点眼薬です。

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。


通常、使用する量および回数は、次のとおりです。

1回1滴、1日1回就寝前に点眼する。

●どのように使用するか？

- ・開封後、最初の1～2滴は点眼せずに捨ててください。
- ・手をよく洗い、容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・薬液が鼻や口などに流れないように、点眼後、1～5分間まぶたを閉じて、涙嚢部（目頭のやや鼻より）を指先で軽く押さえてください。
- ・他の点眼薬も使用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- ・開封後は1回きり（両眼に点眼する必要がある場合は両眼点眼）の使用としてください。点眼後、薬液が残っていてもあとで点眼せず必ず捨ててください（保存剤を含んでおりません）。

リジュセアミニ点眼液 0.025%の点眼方法



●使用し忘れた場合の対応

- ・点眼し忘れに気づいた場合には、忘れた分は点眼せず、次の就寝前に1回1滴を1日1回点眼してください。
- ・1回に2滴点眼したり、1日に2回点眼したりしてはいけません。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがありますので、症状が回復するまでは落下の恐れのある遊具の使用、自転車や自動車などの運転、機械の操作は行わないでください。また、必要に応じてサングラスをかけるなど、太陽の光や強い光を直接見ないようにしてください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・定期的に眼科を受診して、近視の進行状況を確認する検査を受けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？


特にご注意いただきたい副作用と、それぞれの主な症状を記載しました。このような場合には、できるだけ早く医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な自覚症状
羞明	まぶしい
霧視	目のかすみ

以上の症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	まぶしい、目のかすみ

【この薬の形は？】

色	無色澄明
内容量	0.3mL (保存剤を含まない 1 回使い捨てタイプの点眼剤です。)
容器の形状	
	<p>投薬袋</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>[表]</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>[裏]</p>  </div> </div> <p>アルミピロー包装の表示</p> 

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アトロピン硫酸塩水和物
添加剤	濃グリセリン、リン酸二水素ナトリウム水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ヒドロキシエチルセルロース、pH調節剤

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・アルミピロー包装開封前：
室温（1～30℃）で保管してください。
- ・アルミピロー包装開封後：
添付の遮光用投薬袋に入れて、室温（1～30℃）で保管し、3ヵ月以内に使用してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：参天製薬株式会社 (<https://www.santen.co.jp>)

お客様相談室

電話：0120-127-023 06-7664-8623

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）