

レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」

【この薬は？】

販売名	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 (Rebamipide ophthalmic suspension 「Santen」)
一般名	レバミピド Rebamipide
含有量 (1mL中)	20mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、ドライアイ治療剤と呼ばれる点眼剤です。
- ・この薬は、結膜・角膜のムチン（粘液）産生促進作用と、角膜・結膜の上皮の障害を改善する作用があります。
- ・次の病気の人に処方されます。

ドライアイ

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にレバミピド懸濁性点眼液2%「参天」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人。

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

この薬は点眼剤です。

●使用量および回数

通常、1回1滴、1日4回点眼します。

●どのように使用するか？

- ・この薬は懸濁液のため、薬剤が点眼容器に沈殿していることがあります。点眼前にキャップをしたまま点眼容器をよく振ってください。
- ・手をよく洗い、容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・薬液が鼻や口などに流れないように、点眼後、1～5分間まぶたを閉じて、涙嚢部（目頭のやや鼻より）を指先で軽く押さえてください。
- ・点眼後に、目の周りにあふれた液は、清潔なガーゼやティッシュなどで軽くふき取ってください。
- ・他の点眼剤も使用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから、この薬を最後に点眼してください。

●使用し忘れた時の対応

- ・1回に2回分（2滴）を点眼しないでください。
- ・気づいたときにできるだけ早く1回分（1滴）を点眼してください。ただし、次に点眼する時間が近い場合は点眼せずに、次の通常の点眼時間から1回1滴を点眼してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・目の表面、涙道などにこの薬の成分が凝集することがあるため、涙がこぼれ続ける、目やにが増える、目や鼻の奥に違和感がある、目頭周辺が赤く腫れる、目頭周辺が痛むなどの症状があらわれることがあります。この薬を使用する場合には、これらの症状について、医師または薬剤師から十分に説明を受けてください。また、上記の症状や異常を感じたときは、眼科の医師に相談してください。
- ・点眼後、一時的に目がかすむことがありますので、機械の操作や自動車などの運転には注意してください。
- ・この薬に含まれているレバミピドは、ソフトコンタクトレンズに吸着することがあるので、目に違和感を感じたときは眼科の医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。

- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
涙道閉塞 るいどうへいそく	涙がこぼれ続ける、目やにが増える、目に違和感がある
涙嚢炎 るいのうえん	涙がこぼれ続ける、目やにが増える、目に違和感がある、目頭周辺が赤く腫れる、目頭周辺が痛む

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	涙がこぼれ続ける、目やにが増える、目に違和感がある、目頭周辺が赤く腫れる、目頭周辺が痛む

【この薬の形は？】

色	振り混ぜる時、白色に懸濁
内容量	5mL
容器の形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	レバミピド (1 mL 中 20 mg 含有)
添加物	クエン酸ナトリウム水和物、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ポビドン、カルボキシビニルポリマー、硝酸銀、pH調節剤

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・添付の遮光用投薬袋に入れ、光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬剤が分散しにくくなりますので、点眼容器を下向きにして保管しないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：参天製薬株式会社 (<https://www.santen.co.jp>)

お客様相談室

電話：0120-127-023 06-7664-8623

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）