

エイベリス点眼液 0.002%、 エイベリスミニ点眼液 0.002%

【この薬は？】

販売名	エイベリス点眼液 0.002% (EYBELIS ophthalmic solution)	エイベリスミニ点眼液 0.002% (EYBELIS Mini ophthalmic solution)
一般名	オミデネパグ イソプロピル (Omidenepag Isopropyl)	
含有量 (1mL 中)	20 μ g	

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、緑内障・高眼圧症治療剤と呼ばれるグループに属する点眼薬です。
- ・この薬は、眼圧を調節する水分の排出を促進して眼圧を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。

緑内障、高眼圧症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、使用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 水晶体の無い人、眼内レンズを挿入している人
- ・ タフルプロスト（タプロス点眼液、タプコム配合点眼液）を使用している人
- ・ 過去にエイベリス点眼液 0.002%、エイベリスミニ点眼液 0.002%に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・ 虹彩（こうさい）炎やぶどう膜炎などの眼炎症性疾患のある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・ 授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬[タフルプロスト（タプロス点眼液、タプコム配合点眼液）]や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は点眼薬です。

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、使用する量および回数は、次のとおりです。

1回1滴、1日1回点眼する。

●どのように使用するか？

〔エイベリス点眼液 0.002%、エイベリスミニ点眼液 0.002%共通〕

- ・ 手をよく洗い、容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・ 薬液が鼻や口などに流れないように、点眼後、1～5分間まぶたを閉じて、涙嚢部（目頭のやや鼻より）を指先で軽く押さえてください。
- ・ 他の点眼薬も使用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。


〔エイベリス点眼液 0.002%のみ〕

- ・ ソフトコンタクトレンズをつけている場合には、レンズを外してから点眼し、5～10分間の間隔をあけてからレンズをつけてください。（ベンザルコニウム塩化物がソフトコンタクトレンズに吸着することがあります。）

〔エイベリスミニ点眼液 0.002%のみ〕

- ・ 開封後、最初の1～2滴は点眼せずに捨ててください。
- ・ 点眼後、薬液が残っていてもあとで点眼せず必ず捨ててください（保存剤を含んでおりません）。

エイベリスミニ点眼液 0.002%の点眼方法



●使用し忘れた場合の対応

- ・ 1回に2滴点眼したり、1日に2回点眼したりしてはいけません。
- ・ その日のうちに気づいた場合は、すぐに1回1滴を点眼してください。
- ・ 翌日に気づいた場合には、前日の分は点眼せず、1回1滴を1日1回点眼してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・ 異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 視力の低下、見えづらい、まぶしい、目の痛みなどの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合にはただちに受診してください。
- ・ 点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがありますので、症状が回復するまでは機械の操作や自動車などの運転は行わないでください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？


特にご注意ください。重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。
 このような症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
嚢胞様黄斑浮腫を含む黄斑浮腫 <small>のうほうようおうはんふしゅをふくむおうはんふしゅ</small>	視力の低下、見えづらい、眼のかすみ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
 このような症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	視力の低下、見えづらい、眼のかすみ

【この薬の形は？】

販売名	エイベリス点眼液 0.002%	エイベリスミニ点眼液 0.002%
色	無色澄明	
内容量	2.5mL (5mL 用点眼容器に 2.5mL 入っていますので、液の量が少なく見えます。)	0.3mL (保存剤を含まない 1 回使い捨てタイプの点眼剤です。)
容器の形状		



【この薬に含まれているのは？】

有効成分	オミデネパグ イソプロピル
添加物	ポリオキシシル 35 ヒマシ油、濃グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物※、pH調節剤 ※エイベリス点眼液 0.002%のみ

【その他】

●この薬の保管方法は？

〔エイベリス点眼液 0.002%、エイベリスミニ点眼液 0.002%共通〕

- ・子供の手の届かないところに保管してください。

〔エイベリス点眼液 0.002%のみ〕

- ・光、凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。
- ・点眼容器開封後は添付の遮光用投薬袋に入れて、1ヵ月以内であれば室温（1～30℃）で保管することもできます。

〔エイベリスミニ点眼液 0.002%のみ〕

- ・アルミピロー包装開封前：
凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。
- ・アルミピロー包装開封後：
添付の遮光用投薬袋に入れて、凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管し、1年以内に使用してください。1ヵ月以内であれば室温（1～30℃）で保管することもできます。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：参天製薬株式会社 (<https://www.santen.co.jp>)

お客様相談室

電話：0120-127-023 06-7664-8623

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）