

セロシオンカプセル10

【この薬は？】

販売名	セロシオンカプセル10 Serocion Capsules 10
一般名	プロパゲルマニウム Propagermanium
含有量 (1カプセル中)	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> 添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、経口B型慢性肝炎治療剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、からだの免疫力を高めることにより、肝炎ウイルスに感染している細胞を破壊し、肝炎ウイルスを排除したり、肝炎ウイルスの増殖を抑制することにより、肝炎の症状を改善します。
- ・次の目的で処方されます。

HB e抗原陽性B型慢性肝炎におけるウイルスマーカーの改善

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬により、慢性肝炎が急に悪化することがあり、死亡例が報告されています。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・黄疸のある人

- ・肝硬変のある人、肝硬変の疑いがある人
 - ・過去にセロシオンカプセルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
- ・過去に薬剤で過敏な反応を経験したことがある人
 - ・過去に黄疸があった人
 - ・インターフェロンの使用を終了した直後の人
 - ・腎臓に重篤な障害がある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬の使用前に肝炎ウイルス等の検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

1回1カプセルを1日3回毎食後に飲みます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を16週間使用しても効果がみられない場合は、他の療法が行われることがあります。
- ・B型慢性肝炎が急に悪化することがあるので、使い始めの2、4、6週目には肝機能検査が行われます。その後も定期的に行われます。また、4週ごとに臨床検査も行われます。
- ・この薬の使用中に、白目や皮膚が黄色くなったり、褐色の尿がみられた場合は、ただちに受診してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
B型慢性肝炎の急性増悪 ビーがたまんせいかんえんのきゅうせいぞうあく	体がだるい、吐き気、嘔吐、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、発熱、体がかゆくなる
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気、嘔吐
腹部	食欲不振、上腹部痛
皮膚	皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

販売名	セロシオンカプセル10
PTPシート	
形状	硬カプセル剤 
全長	14.5mm
重さ	220mg
色	白色
識別コード	Sc281

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	プロパゲルマニウム
添加物	ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、ラウリル硫酸ナトリウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。
製造販売会社：株式会社三和化学研究所 (<https://www.skk-net.com/>)
電話番号：0120-19-8130
受付時間：9時～17時（土、日、祝日、その他休業日を除く）