

ラタノプロスト点眼液 0.005% 「S E C」

【この薬は？】

販売名	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「S E C」 (Latanoprost ophthalmic solution 「S E C」)
一般名	ラタノプロスト (Latanoprost)
含有量 (1mL 中)	50 μ g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、緑内障・高眼圧症治療剤と呼ばれるグループに属する点眼薬です。
- ・この薬は、眼圧を調節する水分の排出を促進して眼圧を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。

緑内障、高眼圧症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、点眼量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にラタノプロスト点眼液 0.005% 「S E C」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前にそのことを医師または薬剤師に教えてください。

- ・ 水晶体の無い人、眼内レンズを挿入している人
- ・ 気管支喘息のある人、または気管支喘息になったことのある人
- ・ 虹彩（こうさい）炎やぶどう膜炎などの眼内炎のある人
- ・ ヘルペスウイルスに罹っている人、または過去にヘルペスウイルスに罹ったことがある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・ 授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、使用する量および回数は次のとおりです。

1回1滴、1日1回点眼する。

- ・ 頻繁に点眼すると眼圧を下げる作用が弱まる可能性がありますので、1日1回を超えて点眼しないでください。

●どのように使用するか？

- ・ 手を良く洗い、点眼するときの容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・ 目の周りに点眼液がついていると、目の周りが黒ずむ、まつげが長く、太くなることがあるため、すぐに濡らしたガーゼやティッシュでふき取るようにしてください。
- ・ 他の点眼薬も使用する場合には、少なくとも5分間以上間隔をあけてから点眼してください。
- ・ コンタクトレンズをつけている場合には、レンズを外してから点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。（コンタクトレンズが変色することがあります。）

●使用し忘れた場合の対応

- ・ 決して1日に2滴点眼してはいけません。その日のうちであれば、1回1滴を点眼してください。
- ・ 翌日に点眼し忘れたことを気づいた場合でも、1日1回1滴の用法を守ってください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・ 異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 虹彩色素沈着（メラニンの増加により黒目（虹彩）の色が濃くなる）があらわれることがあります。点眼を中止しても瞳の色が元に戻らないことがあります。また、片眼のみ点眼している場合には、左右の瞳の色に差がでる場合もあります。この薬を点眼する場合には、虹彩色素沈着について、医師、薬剤師等から十分説明を受けてください。
- ・ 眼の異常感（しみる、かゆみ、痛みなど）、眼のかすみ、視力の低下があらわ

れることがあります。このような自覚症状が持続する場合にはただちに受診してください。

- ・閉塞隅角緑内障と診断された人は医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- ・点眼後、一時的に目がかすむことがありますので、症状が回復するまでは機械の操作や自動車などの運転は行わないでください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。
このような症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
虹彩色素沈着 こうさいしきそちんちゃく	黒目（虹彩）の色が濃くなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
このような症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	黒目（虹彩）の色が濃くなる

【この薬の形は？】

色	無色澄明
内容量	2.5mL (5mL 用点眼容器に 2.5mL 入っていますので、 液の量が少なく見えます。)
容器の形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ラタノプロスト
添加物	ポリソルベート 80、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。
- ・点眼容器開封後は、1 か月以内であれば室温（1～30℃）で保管することもできます。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

発売会社：参天製薬株式会社（<https://www.santen.co.jp>）

お客様相談室

電話：0120-127-023 06-7664-8623

受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

製造販売会社：参天アイケア株式会社