

## ゾコーバ錠 125mg

### 【この薬は？】

販売名	ゾコーバ錠 125mg Xocova Tablets 125mg
一般名	エンシトレルビル フマル酸 Ensitrelvir Fumaric Acid
含有量 (1錠中)	152.3mg (エンシトレルビルとして125mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の3CLプロテアーゼを阻害し、ポリタンパク質の切断を阻止することにより、ウイルスの複製を阻害します。
- ・次の病気の人に処方されます。

### **SARS-CoV-2による感染症**

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にゾコーバ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・次の薬を使用している人

ピモジド（オーラップ）、キニジン硫酸塩水和物、ベプリジル塩酸塩水和物（ベプリコール）、チカグレロル（ブリリンタ）、エプレレノン（セララ）、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン）、エルゴメトリンマレイン酸塩、メチルエルゴメトリンマレイン酸塩（パルタンM）、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、シンバスタチン（リポバス）、トリアゾラム（ハルシオン）、アナモレリン塩酸塩（エドルミズ）、イバブラジン塩酸塩（コララン）、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）（ベネクレクスタ）、イブルチニブ（イムブルビカ）、ブロナンセリン（ロナセン）、ルラシドン塩酸塩（ラツェダ）、アゼルニジピン（カルブロック）、アゼルニジピン・オルメサルタン メドキシミル（レザルタス配合錠）、スポレキサント（ベルソムラ）、タダラフィル（アドシルカ）、バルデナフィル塩酸塩水和物（レビトラ）、ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッド）、リファブチン（ミコブティン）、フィネレノン（ケレンディア）、リバーロキサバン（イグザレルト）、リオシグアト（アデムパス）、アパルタミド（アーリーダ）、カルバマゼピン（テグレートール）、エンザルタミド（イクスタンジ）、ミトタン（オペプリム）、フェニトイン（ヒダントール、アレビアチン）、ホスフェニトインナトリウム水和物（ホストイン）、リファンピシン（リファジン）

- ・次の食品を摂取している人

セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品

- ・肝臓や腎臓に障害がある人で、コルヒチンを使用している人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・肝臓に重度の障害がある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬と飲食物（○次の人は、この薬を使用することはできません。を参照）や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用して

いる場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

- ・この薬は、SARS-CoV-2による感染症の症状があらわれてから72時間以内に使用が開始されます。
- ・飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。  
通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

	12歳以上の小児および成人	
1回量	1日目	2日目から5日目
	3錠	1錠
飲む回数	1日1回	

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は他の薬との飲み合わせなどに注意する必要があります。現在使っている薬を全て医師または薬剤師に報告してください。また、新たに薬を使い始める場合はあらかじめ医師または薬剤師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・妊娠する可能性がある人は、この薬の使用中小および使用終了後2週間は適切な避妊をしてください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は？





特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【この薬の形は？】

形状	円形の錠剤	
		
PTPシート		
	表面	裏面
直径	9.0 mm	
厚さ	4.9 mm/4.4 mm	
重さ	346 mg	
色	白色～淡黄白色	
識別コード	㊉ 711 : 125	

\* : 厚さの違う2種類の錠剤がありますが、どちらか片方が処方されます。

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	エンシトレルビル フマル酸
添加剤	D-マンニトール、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：塩野義製薬株式会社

(<https://www.shionogi.com/jp/ja/>)

医薬情報センター

電話：0120-501-074

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）