患者向医薬品ガイド

２０２５年３月作成

ゾコーバ錠１２５ｍｇ

【この薬は？】

販売名	ゾコーバ錠１２５ｍｇ Xocova Tablets １２５ｍｇ
一般名	エンシトレルビル　フマル酸 Ensitrelvir Fumaric Acid
含有量 （１錠中）	１５２．３ｍｇ （エンシトレルビルとして１２５ｍｇ）

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.htmlに添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は、抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
・この薬は、新型コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）の３ＣＬプロテアーゼを阻害し、ポリタンパク質の切断を阻止することにより、ウイルスの複製を阻害します。
・次の病気の人に処方されます。
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症
・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

〇次の人は、この薬を使用することはできません。
・過去にゾコーバ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
・次の薬を使用している人
ピモジド（オーラップ）、キニジン硫酸塩水和物、ベプリジル塩酸塩水和物（ベプリコール）、チカグレロル（ブリリンタ）、エプレレノン（セララ）、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン）、エルゴメトリンマレイン酸塩、メチルエルゴメトリンマレイン酸塩（パルタンＭ）、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、シンバスタチン（リポバス）、トリアゾラム（ハルシオン）、アナモレリン塩酸塩（エドルミズ）、イバブラジン塩酸塩（コララン）、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）（ベネクレクスタ）、イブルチニブ（イムブルビカ）、ブロナンセリン（ロナセン）、ルラシドン塩酸塩（ラツーダ）、アゼルニジピン（カルブロック）、アゼルニジピン・オルメサルタン　メドキソミル（レザルタス配合錠）、スボレキサント（ベルソムラ）、ダリドレキサント塩酸塩（クービビック）、タダラフィル（アドシルカ）、マシテンタン・タダラフィル（ユバンシ配合錠）、バルデナフィル塩酸塩水和物（レビトラ）、ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッド）、リファブチン（ミコブティン）、フィネレノン（ケレンディア）、ボクロスポリン（ルプキネス）、ロナファルニブ（ゾキンヴィ）、リバーロキサバン（イグザレルト）、リオシグアト（アデムパス）、アパルタミド（アーリーダ）、カルバマゼピン（テグレトール）、エンザルタミド（イクスタンジ）、ミトタン（オペプリム）、フェニトイン（ヒダントール、アレビアチン）、ホスフェニトインナトリウム水和物（ホストイン）、リファンピシン（リファジン）
・次の食品を摂取している人
セイヨウオトギリソウ（St.John’s Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品
・肝臓や腎臓に障害がある人で、コルヒチンを使用している人
・妊婦または妊娠している可能性のある人
〇次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
・授乳中の人
〇この薬には併用してはいけない薬と飲食物（〇次の人は、この薬を使用すること

はできません。を参照）や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○妊娠する可能性がある人は、この薬を使用する前に医師や薬剤師が妊娠していないこと及び妊娠している可能性がないことを確認します。また、以下について説明を受け、十分に理解してください。

・この薬は胎児に影響を及ぼす可能性があること。

・この薬の使用中に妊娠がわかったり妊娠が疑われたりした場合には、ただちに使用を中止すること。

・この薬の使用中および使用終了後２週間の間に妊娠していたことがわかったり疑われたりした場合には、すぐに医師または薬剤師に相談すること。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

・この薬は、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症の症状があらわれてから速やかに使用が開始されます。

・飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

	１２歳以上の小児および成人	
１回量	１日目	２日目から５日目
	３錠	１錠
飲む回数	１日１回	

●どのように飲むか？

コップ１杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して２回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、１回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は１回とばして、次の時間に１回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・この薬は他の薬との飲み合わせなどに注意する必要があります。現在使っている薬を全て医師または薬剤師に報告してください。また、新たに薬を使い始める場合はあらかじめ医師または薬剤師に相談してください。
・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
・妊娠する可能性がある人は、この薬の使用中および使用終了後２週間は適切な避妊をしてください。
・この薬の使用中および使用終了後２週間の間に妊娠していたことがわかったり疑われたりした場合には、ただちに使用を中止して医師または薬剤師に相談してください。
・授乳している人は医師に相談してください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック、アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
頭部	めまい、意識の消失
全身	ふらつき、冷汗が出る
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

形状	円形の錠剤	
		
ＰＴＰシート	 表面　　裏面	 表面　　裏面
直径	９．０ｍｍ	
厚さ	４．９ｍｍ/４．４ｍｍ	
重さ	３４６ｍｇ	
色	白色～淡黄白色	
識別コード	㊫　　７１１：１２５	

＊：厚さの違う２種類の錠剤がありますが、どちらか片方が処方されます。

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	エンシトレルビル　フマル酸
添加剤	D-マンニトール、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

・絶対に他の人に渡してはいけません。
・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：塩野義製薬株式会社
(https://www.shionogi.com/jp/ja/)
医薬情報センター
電話：０１２０－５０１－０７４
受付時間：９時～１７時（土、日、祝日を除く）