

イミグラン点鼻液20

【この薬は？】

販売名	イミグラン点鼻液20 IMIGRAN Nasal Spray 20
一般名	スマトリプタン Sumatriptan
含有量 (1容器0.1mL中)	スマトリプタンとして20mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、5-HT_{1B/1D}受容体作動型片頭痛治療剤と呼ばれるグループに属する点鼻薬です。
- ・この薬は、セロトニン（5-HT）と呼ばれる物質のうちの5-HT_{1B}と5-HT_{1D}受容体に選択的に作用し、頭痛発作時の拡張しすぎた頭部の血管を収縮させること、および神経末端からの炎症を起こす物質の放出を抑えることにより、片頭痛を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

片頭痛

- ・家族性片麻痺性片頭痛、弧発性片麻痺性片頭痛、脳底型片頭痛あるいは眼筋麻痺性片頭痛の人は、この薬を使用することができません。
- ・この薬は、量を加減せず、医師の指示どおりに使用してください。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にイミグラン点鼻液に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・過去に心筋梗塞になったことがある人、虚血性心疾患であるかまたはその症状や兆候がある人、異型狭心症（冠動脈攣縮）がある人
- ・脳血管障害や一過性脳虚血性発作になったことがある人
- ・末梢血管障害がある人
- ・血圧管理が不十分な高血圧の人
- ・肝臓に重篤な障害がある人
- ・エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、あるいは5-HT_{1B/1D}受容体作動薬（イミグランと同じ作用の他の片頭痛治療薬）を使用している人
- ・モノアミンオキシダーゼ阻害剤（MAO阻害剤）を使用している人、あるいはモノアミンオキシダーゼ阻害剤の使用を中止して2週間以内の人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・虚血性心疾患の可能性がある人（例えば、虚血性心疾患を疑わせる重篤な不整脈がある人、閉経後の女性、40歳以上の男性、冠動脈疾患になりやすい人）
- ・過去にてんかん様発作があった人、あるいはてんかん様発作を来しやすい人（脳炎等の脳疾患がある人、痙攣（けいれん）の閾値を低下させる薬剤を使用している人等）
- ・過去にスルホンアミド系薬剤で過敏症のあった人
- ・血圧管理が十分行われている高血圧の人
- ・脳血管障害の可能性のある人
- ・腎臓に障害がある人
- ・肝臓に障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬 [エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン）、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、エルゴメトリンマレイン酸塩（エルゴメトリンF）、メチルエルゴメトリンマレイン酸塩（パルタンM）、ゾルミトリプタン（ゾーミック）、エレクトリプタン臭化水素酸塩（レルパックス）、リザトリプタン安息香酸塩（マクサルト）、ナラトリプタン塩酸塩（アマージ）、モノアミンオキシダーゼ阻害剤] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は鼻腔内に使用する点鼻薬です。

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

一回量	1容器
使用回数	頭痛発作発現時に1容器を使用します。

効果が不十分な場合には、追加投与をすることができますが、前回の投与から2時間以上あけてください。 ただし、1日の総投与量を2容器以内としてください。

- ・この薬は頭痛発作発現時にのみ使用し、予防を目的として使用しないでください。
- ・この薬を使用しても全く効果が認められない場合には、他の原因による頭痛の可能性があるので、それ以上この薬を使用せず、医師に相談してください。
- ・スマトリプタン錠（イミグラン錠等）またはイミグラン注射液と組み合わせて使用する場合、
 - ・この薬を使用した後に、スマトリプタン錠またはイミグラン注射液を使用する場合には、2時間以上の間隔をあけてください。
 - ・スマトリプタン錠を使用後に、この薬を使用する場合は、2時間以上の間隔をあけてください。
 - ・イミグラン注射液を使用後に、この薬を使用する場合は、1時間以上の間隔をあけてください。

●どのように使用するか？

- ・必ず使用説明書を受け取り、使用方法の説明を受けてください。
- ・鼻水、鼻づまりがある場合には、この薬を噴霧する前に鼻をかんでください。
- ・具体的な使用方法は、末尾に添付しています。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・異常を感じたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を使用後、胸の痛みや胸の圧迫感などの一時的な症状があらわれることがあるので（強く咽喉頭（いんこうとう）の辺りまで症状が出る場合もあります）、これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・心血管系の病気がない人でも、心臓に重篤な障害が極めてまれに起こることがあるので、異常を感じた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・頭痛発現時あるいはこの薬を投与した後に眠気があらわれることがありますので、この薬を使用している間は自動車の運転等危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・この薬を含むトリプタン系の薬により、頭痛が悪化することがあるので、この薬を使用しても良くならない場合には医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・この薬を使用した後12時間は授乳しないことが望ましいため、授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のう

ち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
 このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシー ショック	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸 (どつき)、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白(そうはく)、手足 が冷たくなる
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動 悸、息苦しい
虚血性心疾患様症 状 きょけつせいしんしつかんよ うしょうじょう	しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけら れた感じ、冷汗が出る、息苦しい
てんかん様発作 てんかんようほっさ	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意 識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
薬剤の使用過多に よる頭痛 やくざいのしょうかたによる づつう	頭痛

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
 これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、冷汗が出る、顔や手足の筋肉がぴくつく
頭部	めまい、一時的にボーっとする、意識の低下、頭痛
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい、しめ付けられるような胸の痛み、胸を 強く押さえつけられた感じ
手・足	手足が冷たくなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震え る
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

性状	内容物は黄色～暗黄色澄明の液である。
内容量	1容器0.1mL(1回分)
形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	スマトリプタン
添加剤	リン酸ニ水素カリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、硫酸、水酸化ナトリウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：

グラクソ・スミスクライン株式会社 (<http://jp.gsk.com>)

カスタマー・ケア・センター

電話：0120-561-007

受付時間：9時～17時45分（土、日、祝日および当社休業日を除く）

使用方法

1



使用する直前にパックから噴霧器を取り出してください。
必要に応じて、鼻をかんで鼻腔の通りをよくしてください。

2



人差し指と中指でノズルの両側を押さえ、親指で青い押し上げボタンを軽く支えてください。
この時には、まだ青い押し上げボタンを押さないようにしてください。

3



どちらか片方*の鼻孔内にノズルの先端を鼻の奥に向けて1cm位入れてください。
頭をうつむき加減にし、口を閉じ、鼻からゆっくり息を吸い込みながら、青い押し上げボタンを強めに押し上げて噴霧してください。

※両方の鼻孔へ噴霧する必要はありません。

4



噴霧後は、頭をうつむき加減の状態に保ち、薬剤が垂れないようにしばらくの間鼻をつまみ、口で静かに呼吸してください。
鼻をかまないでください。