

## テノゼット錠 300mg

### 【この薬は？】

販売名	テノゼット錠 300mg Tenozet Tablets
一般名	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 Tenofovir Disoproxil Fumarate
含有量 (1錠中)	300mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、B型肝炎ウイルス（HBV）の増殖を抑えることによりウイルス量を減らします。
- ・次の目的で処方されます。

#### **B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制**

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬での治療終了後にB型慢性肝炎が急激に悪化したとの報告があるため、使用終了後少なくとも数カ月間は検査が行われます。また、経過に応じてB型肝炎に対する再治療が必要になることがあります。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にテノゼット錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・HIVに感染している人
  - ・腎機能障害の危険性がある人
  - ・腎臓に障害がある人
  - ・非代償性肝硬変の人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の使用前に肝炎ウイルスの検査、腎機能検査やH I V感染の検査が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。特に腎臓に障害のある人においては慎重に飲む量が決められます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

1回1錠を1日1回飲みます。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、ただちに医師に連絡してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を飲んでいる間は、腎機能障害があらわれることがあるので、これらの症状があらわれたら医師に相談してください。腎機能検査などが定期的に行われます。
- ・この薬を飲んでいる間は、骨密度が低下することがあります。特に、過去に病的骨折を起こしたことがある人や慢性骨疾患のある人では注意が必要です。
- ・この薬の服用を中止すると肝機能の悪化やB型肝炎の症状が重くなることがあるので、自己判断で服用を中止しないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。

- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいないことを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
重度の腎機能障害 (腎機能不全、腎不全、急性腎障害、近位腎尿細管機能障害、ファンコニー症候群、急性腎尿細管壊死、腎性尿崩症又は腎炎) <small>じゅうどのじんきのうしょうがい(じんきのうふぜん、じんふぜん、きゅうせいじんしょうがい、きんいじんにようさいかんきのうしょうがい、ふあんこにーしょうこうぐん、きゅうせいじんにようさいかんえし、じんせいにようほうしょうまたはじんえん)</small>	尿量が減る、むくみ、体がだるい、筋力の低下、骨痛、尿量が増える、喉が渇く、多飲
乳酸アシドーシス <small>にゅうさんあしどーしす</small>	頭痛、眠くなる、意識の低下
脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝) <small>しぼうちんちゃくによるじゅうどのかんしゅだい(しぼうかん)</small>	体がだるい、吐き気、食欲不振、発熱、腹痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる
膵炎 <small>すいえん</small>	強い腹痛、背中の痛み、お腹が張る、吐き気、嘔吐(おうと)、体重が減る、喉が渇く、尿量が増える、皮膚が黄色くなる、油っぽい下痢が出る

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	むくみ、体がだるい、発熱、体がかゆくなる、体重が減る、骨痛
頭部	頭痛、眠くなる、意識の低下

部位	自覚症状
眼	白目が黄色くなる
口や喉	喉が渇く、多飲、吐き気、嘔吐
腹部	食欲不振、腹痛、強い腹痛、お腹が張る
背中	背中痛み
皮膚	皮膚が黄色くなる
筋肉	筋力の低下
便	油っぽい下痢が出る
尿	尿の色が濃くなる、尿量が減る、尿量が増える

## 【この薬の形は？】

形状	アーモンド状の楕円形の錠剤	
	 <p style="text-align: center;">表                      裏                      側面</p>	
	瓶（30錠入り）	
		
直径	長径	17.0 mm
	短径	10.5 mm
厚さ	5.3 mm	
重さ	693 mg	
色	白色	
識別コード	G S K 300	

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩
添加物	部分アルファー化デンプン、クロスカルメロースナトリウム、乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、トリアセチン

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：

グラクソ・スミスクライン株式会社 (<http://jp.gsk.com>)

カスタマー・ケア・センター

電話：0120-561-007

受付時間：9時～17時45分（土、日、祝日および当社休業日を除く）