

ビルタサ懸濁用散分包 8.4g

【この薬は？】

販売名	ビルタサ懸濁用散分包 8.4g Veltassa 8.4g powder for suspension (Single-dose package)
一般名	パチロマーソルビテクスカルシウム (Patiromer Sorbitex Calcium)
含有量 (1包中)	パチロマーソルビテクスカルシウムをパチロマーとして 8.4g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、高カリウム血症改善剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、消化管内のカリウムと結合することにより糞中カリウム排泄量を増加させます。吸収されるカリウムが少なくなることで血清カリウム値を低下させ、高カリウム血症を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

高カリウム血症

- ・この薬は、効果発現が緩徐であるため、緊急の治療が必要な高カリウム血症の治療には使用できません。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にビルタサ懸濁用散分包に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
 - ・腸閉塞（腸が詰まった状態）の人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・重い便秘の人
 - ・重い腸管狭窄（腸が狭くなって、食べたものが通りにくくなった状態）のある人
 - ・重い消化管運動障害のある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	8.4 g から使用を開始します。その後、血清カリウム値や状態に応じて使用量が調節されます。最高用量は25.2 g です。
飲む回数	1日1回

増量される場合は、1週間以上の間隔を空けて8.4 g ずつ増量されます。血清カリウム値によって、減量または中止されることがあります。

●どのように飲むか？

8.4 g 1包を飲む場合には約40～80 mLの水に懸濁してください。初めに半量程度の水をコップ等の容器に入れ、分包内の薬をコップ等の容器に移して一度懸濁し、残りの水を追加して再度懸濁してください。必要に応じて飲みやすいように水を追加してください。一度に2包以上をまとめて飲む場合には水の量は約80 mLとし、1包を飲む場合と同様の操作で水に懸濁して服用してください。この薬は溶けないため、十分に懸濁し、沈殿する前に飲んでください。沈殿した場合は、再び懸濁して飲んでください。

飲んだ後にコップ等の容器に薬が残っていないことを確認し、残っている場合にはさらに水を追加し、残った薬を飲み切ってください。

●飲み忘れた場合の対応

翌日以降に決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、同日中に飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

低カリウム血症により不整脈（めまい、動悸（どうき）、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ）などがあらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合には、使用を中止し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・血清カリウム値を測定するために、血液検査が行われます。
- ・この薬の飲み始めや薬の量を調整した時は、1週間後を目安に血清カリウム値の測定が行われます。また、この薬の使用中には、低カリウム血症により不整脈などがあらわれることがありますので、体の状態などに応じて、定期的に血清カリウム値の測定が行われます。血液透析をしている場合は透析前に血清カリウム値の測定が行われます。
- ・腸管穿孔（腸に穴があいた状態）、腸閉塞を起こす可能性が否定できないため、排便状況を確認し、便秘に引き続き持続する腹痛、嘔吐等の症状があらわれた場合には、速やかに医師または薬剤師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？



特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低カリウム血症 ていかりうもけっしょう	体に力が入らない、体が動かせない、息苦しい、お腹が張る
腸管穿孔 ちょうかんせんこう	激しい腹痛、吐き気、嘔吐、寒気、発熱、ふらつき、息切れ、意識の低下
腸閉塞 ちょうへいそく	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐、お腹が張る、腹痛

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	寒気、発熱、ふらつき、体に力が入らない、体が動かせない
頭部	意識の低下
口や喉	吐き気、嘔吐
胸部	息切れ、息苦しい
腹部	激しい腹痛、お腹が張る、腹痛
便	便やおならが出にくい

【この薬の形は？】

形状	<p style="text-align: center;">懸濁用散剤</p> 	
分包		
性状	<p>微黄白色～淡褐色の粉末であり、ときに白色の粒がある</p>	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	パチロマーソルビテクスカルシウム
添加剤	キサンタンガム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・ 冷蔵庫（2～8℃）で保管してください。
- ・ 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管することも可能ですが、その場合3ヵ月以内に使用してください。3ヵ月を超えた薬は保管せず、廃棄してください。
- ・ 懸濁後の薬を飲まなかった場合、保管せず廃棄してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ゼリア新薬工業株式会社 (<https://www.zeria.co.jp>)

お客様相談室

電話：03-3661-0277

受付時間：9：00～17：50

(土日祝日・弊社休業日を除く)