

アジマイシン点眼液1%

【この薬は？】

販売名：アジマイシン点眼液1%（AZIMYCIN OPHTHALMIC SOLUTION 1%）

一般名：アジスロマイシン水和物（Azithromycin hydrate）

含有量（1g中）：10.48mg（アジスロマイシンとして10mg力価）

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> の「医薬品に関する情報」に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、マクロライド系抗菌剤と呼ばれるグループに属する点眼薬です。
- ・この薬は、感染症の原因となる細菌の増殖を阻止または殺菌する作用があります。
- ・次の病気の人に処方されます。

<適応症>

結膜炎、眼瞼炎、麦粒腫、涙囊炎

<適応菌種>

アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、アクネ菌

- ・この薬は、自己判断で使用を中止したり、回数を減らしたりすると、治療効果が低下するだけでなく、原因菌がこの薬の効かないものに変化したり、他の抗菌薬も効かなくなったりする可能性があります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にアジマイシン点眼液1%に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・過去に他のマクロライド系またはケトライド系薬剤で過敏症のあった人
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

この薬は点眼液です。

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

<結膜炎>

通常、成人及び7歳以上の小児には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回5日間点眼します。

点眼日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
点眼回数	1日2回点眼		1日1回点眼				
	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴
	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴

<眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎>

通常、成人には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回12日間点眼します。

点眼日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
	1日2回点眼		1日1回点眼				
点眼回数	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴
	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴					

点眼日	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目
	1日1回点眼						
点眼回数	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴	↑ 1回1滴

●**どのように使用するのか？**

- ・キャップをしたまま容器を下に向けた状態で数回振ってからキャップを開けて点眼してください。
- ・容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。

●**使用し忘れた場合の対応**

- ・1回に2滴点眼したり、1日に指示された回数を超えて点眼してはいけません。
- ・その日のうちに気づいた場合は、すぐに1回1滴を点眼してください。ただし、次の点眼する時間が近い場合は1回飛ばして、次の時間に1回1滴を点眼してください。
- ・翌日に気づいた場合は、前日分は点眼せず、当日分の1回1滴1日1回または2回分を点眼してください。

●**多く使用した時（過量使用時）の対応**

- ・異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・原因菌がこの薬の効かないものに変化するなどの可能性があることから、患者さんは正しい使用方法について十分に理解できるまで説明を受け、指示どおりに使用してください。
- ・この薬の使用中に角膜障害（角膜びらん、角膜潰瘍など）があらわれることがあります。目のかすみ、目の異物感、目の痛みなどの自覚症状があらわれた場合にはただちに投与を中止し受診してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？


特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
角膜潰瘍などの角膜障害 かくまくかいようなどのかくまくしょうがい	目の痛み、目の異物感、涙がでる、まぶしい、目の充血、視力の低下
ショック ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき
頭部	めまい、意識の消失
顔面	顔面蒼白
眼	目の痛み、目の異物感、涙がでる、まぶしい、目の充血、視力の低下
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

色	微白色で濁りのある粘性の液体
内容量	2.5mL
容器	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アジスロマイシン水和物
添加物	D-マンニトール、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ポリカルボフィル、エデト酸ナトリウム水和物、ポリオキシエチレン(196) ポリオキシプロピレン(67) グリコール、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、pH調節剤

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて、開栓前は冷蔵庫（2～8℃）で保管し、開栓後は室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：千寿製薬株式会社（<http://www.senju.co.jp>）

カスタマーサポート室

電話番号：0120-069-618

受付時間：9：00～17：30

（土、日、祝日を除く）