患者向医薬品ガイド

2024年11月更新

リトゴビ錠4mg

【この薬は？】

販売名	リトゴビ錠4mg Lytgobi Tablets
一般名	フチバチニブ Futibatinib
含有量 （１錠中）	4mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は、抗悪性腫瘍剤に属する薬です。
・この薬は、遺伝子異常を持つ繊維芽細胞増殖因子受容体（FGFR）というタンパクの働きを阻害することにより、がん細胞の増殖を抑制します。
・次の病気の人に処方されます。
がん化学療法後に増悪した*FGFR2*融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌
・一次治療としての有効性および安全性は確立していません。
・術後補助療法における有効性および安全性は確立していません。
・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○患者さんまたは家族の方は、この薬の必要性や注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意をした場合に使用が開始されます。

○この薬を使用する前に、*FGFR2*融合遺伝子検査*が行われます。

***FGFR2*融合遺伝子検査：がん細胞組織や血液を使用して、*FGFR2*融合遺伝子が認められるかどうかを調べる検査

○次の人は、この薬を使用することはできません。

・過去にリトゴビ錠に含まれる成分で過敏症を経験したことがある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

・肝臓に中等度以上の障害のある人
・妊婦または妊娠している可能性のある人
・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

１回量	５錠
飲む回数	１日１回
飲み方	食事の１時間前から食後２時間までの間の服用は避けてください。

・他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性および安全性は確立していません。
・副作用などにより、この薬を減量、休薬または中止することがあります。

●どのように飲むか？

・コップ１杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

・決して２回分を一度に飲まないでください。
・飲み忘れに気がついた場合には、服用の予定時刻から１２時間以内であれば服用し、１２時間以上経過している場合にはその日は飲まずに、次の日から１回分の薬を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

・異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・網膜剥離があらわれることがあるので、この薬の使用中は、定期的な眼科検査が行われる場合があります。小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化、視界の中に閃光のような光がみえる、視界にカーテンのような黒幕がみえる、物がゆがんで見える、視界の中に見づらい部分がある、視力の低下、目のかすみ、霧がかかったような見え方、物がかすんで見えたり、眼の前に黒い点や小さなごみ、時には輪のようなものが動いて見えたりするなどの症状があらわれた場

合は、ただちに医師に連絡してください。
・高リン血症があらわれることがあるので、この薬の使用中は、定期的に血清リン濃度の測定が行われます。
・妊娠する可能性のある女性は、この薬を使用している間および使用を終了してから１週間は適切に避妊してください。
・男性は、この薬を使用している間および使用を終了してから１週間はバリア法（コンドーム）を用いてください。
・妊婦または妊娠している可能性のある人は、医師に相談してください。
・授乳している人は、医師に相談してください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
網膜剥離 もうまくはくり	小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化、視界の中に閃光のような光がみえる、視界にカーテンのような黒幕がみえる、物がゆがんで見える、視界の中に見づらい部分がある

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化、視界の中に閃光のような光がみえる、視界にカーテンのような黒幕がみえる、物がゆがんで見える、視界の中に見づらい部分がある

【この薬の形は？】

販売名	リトゴビ錠 4mg
形状	フィルムコーティング錠

PTP シート	
直径	6.1mm
厚さ	3.0mm
重さ	82.4mg
色	白色
識別コード	FBN

【この薬に含まれているのは？】

販売名	リトゴビ錠 4mg
有効成分	フチバチニブ
添加物	ラウリル硫酸ナトリウム、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、Ｄ－マンニトール、結晶セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン

【その他】

●この薬の保管方法は？

・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

・絶対に他の人に渡してはいけません。
・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：大鵬薬品工業株式会社（https://www.taiho.co.jp/）
医薬品情報課
電話：０１２０－８０－４５２７
受付時間：９時～１７時
（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）