

ニューレプチル錠 5mg
ニューレプチル錠 10mg
ニューレプチル錠 25mg
ニューレプチル細粒 10%
ニューレプチル内服液 1%

【この薬は？】

販売名	ニューレプチル 錠5mg NEULEPTIL Tablets 5mg	ニューレプチル 錠10mg NEULEPTIL Tablets 10mg	ニューレプチル 錠25mg NEULEPTIL Tablets 25mg	ニューレプチル 細粒10% NEULEPTIL Fine Granules 10%	ニューレプチル 内服液1% NEULEPTIL Internal liquid 1%
一般名	プロペリシアジン製剤 PropERICIAZINE				
含有量	1錠中 5mg	1錠中 10mg	1錠中 25mg	1g中 100mg	1mL中 10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症

- ・この薬は体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・昏睡状態にある人、循環虚脱状態にある人
- ・バルビツール酸誘導体・麻酔剤などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
- ・アドレナリンを使用している人(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く)
- ・過去にニューレプチル錠／細粒／内服液や、フェノチアジン系化合物およびその類似化合物に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・皮質下部の脳障害（脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症等）の疑いのある人
- ・血液障害のある人
- ・褐色細胞腫又はパラガングリオーマ、動脈硬化症あるいは心臓に障害の疑いのある人
- ・重い喘息、肺気腫、呼吸器の感染症にかかっている人
- ・てんかんなどのけいれんを起こす病気のある人、または過去にてんかんなどのけいれんがあった人
- ・高温環境にある人
- ・脱水状態の人や栄養状態の悪い人
- ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人

○この薬には併用してはいけない薬〔アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く) (ボスミン)] や併用を注意すべき薬、接触に注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

ニューレプチル錠 5mg、10mg または 25mg を組み合わせて飲むことがあります。

販売名	ニューレプチル錠 5mg	ニューレプチル錠 10mg	ニューレプチル錠 25mg
1日量	10～60mg		
回数	1日量を数回に分けて飲みます。		

販売名	ニューレプチル細粒 10%	ニューレプチル内服液 1%
1日量	0.1～0.6g	1mL～6mL
回数	1日量を数回に分けて飲みます。	

●どのように飲むか？

〔ニューレプチル錠・ニューレプチル細粒〕

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

〔ニューレプチル内服液〕

誤用の危険を避けるため、原液のまま飲まずに 1 回に飲む量を水、ジュースまたは汁物等に混ぜて、コップ一杯くらいに、必ず薄めて使用してください。

薄めた後はすぐに飲んでください。

付属のスプイトの目盛はそれぞれ約 0.5mL、1mL、2mL、3mL に相当します。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

傾眠（眠気でぼんやりする）、昏睡、血圧低下、錐体外路症状（首のねじれやつっぱり、眼球が上を向く、筋肉のこわばり、手足のふるえやこわばり、動きが遅い）などの症状があらわれる可能性があります。その他に、激越（落ち着きがない、感情が激しくたかぶる）と情緒不安（気が変わりやすい、気分が落ち着かない）、けいれん、口渇、腸閉塞（嘔吐（おうと）、むかむかする、激しい腹痛、排便・排ガスの停止）、心電図変化および不整脈等があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・治療初期に起立性低血圧が起こることがあるので、立ちくらみやめまいなどの症状があらわれたら、医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 (Syndrome malin) あくせいしょうこうぐん (シンドローム マリン)	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
突然死 とつぜんし	気を失う
再生不良性貧血 さいせいふりょうせいひんけつ	めまい、体がだるい、息切れ、動悸、あおあざができる、出血が止まりにくい、発熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしゅう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐、お腹が張る
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず噛むような口に動き、意思に反して体が動く
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) こうりにょうホルモンふてきごうぶんびつしょうこうぐん (エスアイエイディエイチ)	けいれん、意識の低下、意識の消失、吐き気、食欲不振
眼障害 がんしょうがい	物が見えにくい、眼のかすみ、視力の低下
SLE 様症状 エスエルイーようしょうじょう	体がだるい、関節の痛み、発熱、顔の赤い発疹、体重減少

重大な副作用	主な自覚症状
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみゃくけっせんしょう	発熱、皮膚が青紫～暗紫色になる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、体がだるい、出血が止まりにくい、発熱、寒気、突然の高熱、意思に反して体が動く、けいれん、体重減少
頭部	ぼーっとする、気を失う、めまい、意識の低下、意識の消失
顔面	顔の赤い発疹
眼	物が見えにくい、眼のかすみ、視力の低下
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、喉の痛み、吐き気、嘔吐、意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口に動き、唇が青紫色になる
胸部	呼吸数が増える、息切れ、動悸、胸の痛み、突然の息切れ
腹部	お腹が張る、食欲不振
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、関節の痛み、手足の爪が青紫～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	あおあざができる、皮膚が青紫～暗紫色になる
便	便やおならが出にくい
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	ニューレプチル錠5mg	ニューレプチル錠10mg	ニューレプチル錠25mg
PTPシート			
形状	円形の糖衣錠 	円形の糖衣錠 	円形の糖衣錠 
直径	6.1mm	6.1mm	6.1mm
厚さ	3.7mm	3.7mm	3.7mm
重さ	120mg	120mg	120mg
色	微黄だいたい色	淡黄だいたい色	黄だいたい色
識別コード	TTS-581	TTS-582	TTS-583

販売名	ニューレプチル細粒10%	ニューレプチル内服液1%
形状	細粒 	液剤 
色	淡黄色	帯緑黄色透明

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ニューレプチル錠 5mg	ニューレプチル錠 10mg	ニューレプチル錠 25mg
有効成分	プロペリシアジン		
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖、ゼラチン、アラビアゴム末、タルク、沈降炭酸カルシウム、安息香酸ナトリウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルナウバロウ、黄色5号		

販売名	ニューレプチル細粒 10%	ニューレプチル内服液 1%
有効成分	プロペリシアジン	プロペリシアジン
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、含水二酸化ケイ素、メチルセルロース	酒石酸、アスコルビン酸、乾燥亜硫酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、塩酸

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・子供の手の届かないところに保管してください。

[ニューレプチル錠]

直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。

[ニューレプチル細粒]

光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。

[ニューレプチル内服液]

冷蔵庫などの涼しいところ（1～15℃）で保管してください。光をさけて8週間以内に使用してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：高田製薬株式会社

(<https://www.takata-seiyaku.co.jp/>)

くすり相談窓口

電話：0120-989-813

受付時間：9時00分～17時00分

（土、日、祝祭日、弊社休業日を除く）