

患者向医薬品ガイド

2019 年 7 月作成

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg 「タカタ」

【この薬は？】

販売名	ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg 「タカタ」 ZOLMITRIPTAN OD Tablets 2.5mg 「TAKATA」
一般名	ゾルミトリプタン Zolmitriptan
含有量 (1 錠中)	2.5mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、5-HT_{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、セロトニン（5-HT）と呼ばれる物質の 5-HT_{1B} 受容体と 5-HT_{1D} 受容体に選択的に作用し、頭痛発作時の拡張しすぎた頭部の血管を収縮させること、および神経末端からの炎症を起こす物質の放出を抑えることによ

り、片頭痛を改善します。

- ・次の目的で処方されます。

片頭痛

- ・この薬は、量を加減せず、医師の指示に従って飲んでください。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「タカタ」に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・過去に心筋梗塞になったことがある人、虚血性心疾患であるかまたはその症状や兆候がある人、異型狭心症（冠動脈攣縮）がある人
- ・脳血管障害や一過性脳虚血性発作になったことがある人
- ・末梢血管障害がある人
- ・血圧管理が不十分な高血圧の人
- ・エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、あるいは 5-HT_{1B/1D} 受容体作動薬（ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「タカタ」と同じ作用の他の片頭痛治療薬）を使っている人
- ・モノアミン酸化酵素阻害剤（MAO 阻害剤）を使用している人、あるいはモノアミン酸化酵素阻害剤の使用を中止して2週間以内の人
- ・家族性片麻痺性片頭痛、孤発性片麻痺性片頭痛、脳底型片頭痛あるいは眼筋麻痺性片頭痛の人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・虚血性心疾患の可能性がある人（例えば、虚血性心疾患を疑わせる重篤な不整脈がある人、閉経後の女性、40 歳以上の男性、冠動脈疾患の危険因子がある人）
- ・ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群（WPW 症候群）または他の心臓副伝導路と関連した不整脈がある人
- ・肝臓に中等度または重度の障害がある人
- ・脳血管障害の可能性がある人
- ・てんかんあるいは痙攣（けいれん）を起こしやすい器質的脳疾患のある人
- ・血圧管理が十分行われている高血圧の人

○この薬には併用してはいけない薬〔酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン）、メシル酸ジヒドロエルゴタミン（ジヒデルゴット）、マレイン酸エルゴメトリン（エルゴメトリンF）、マレイン酸メチルエルゴメトリン（メテルギン）、コハク酸スマトリプタン（イミグラン）、臭化水素酸エレクトリプタン（レルパックス）、安息香酸リザトリプタン（マクサルト）、ナラトリプタン塩酸塩（アマージ）、モノアミン酸化酵素阻害剤〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してく

ださい。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	1 回 1 錠 効果不十分な場合は、次回片頭痛発作発現時より 1 回 2 錠に増量するよう指示されることがあります。
飲む回数	頭痛発作発現時に 1 回飲んでください。 1 日 2 回以上飲む場合は、前回飲んでから 2 時間以上あけてください。

- ・ 1 日 4 錠を超えて飲まないでください。

●どのように飲むか？

- ・ 口の中で溶かして飲む薬です。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。唾液だけでは飲み込めない場合は、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲み込んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・ 異常を感じたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。なお、多く使用した時に鎮静（傾眠・無力症）が認められたという報告があります。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬を使用後、胸の痛みや胸の圧迫感などの一時的な症状があらわれることがあるので（強く咽喉頭の辺りまで症状が出る場合もあります）、これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・ 心血管系の病気がない人でも、心臓に重篤な障害が極めてまれに起こることがあるので、異常を感じた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・ この薬を含むトリプタン系の薬により、頭痛が悪化することがあるので、この薬を使用しても良くならない場合には医師に相談してください。
- ・ 頭痛発現時あるいはこの薬を投与した後に眠気があらわれることがありますので、この薬を使用している間は自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳を避けてください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシーショック	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
不整脈 ふせいみやく	めまい、動悸、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ
狭心症あるいは心筋梗塞を含む虚血性心疾患様症状 きょうしんしょうあるいはしんきんこうそくをふくむきよけつせいしんしつかんようしょうじょう	しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、冷汗が出る、息苦しい
頻脈（WPW 症候群における） ひんみやく（ダブルユ・ピー・ダブルユしょうこうぐんにおける）	動悸、胸の不快感、脈が速くなる、めまい、気を失う
薬剤の使用過多による頭痛 やくざいのしょうかたによるずつう	頭痛
てんかん様発作 てんかんようほっさ	顔や手足の筋肉がびくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。

これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、冷汗が出る、顔や手足の筋肉がびくつく
頭部	めまい、気を失う、一時的にボーっとする、頭痛、意識の低下
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい、しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、胸の不快感

部位	自覚症状
手・足	手足が冷たくなる、脈が遅くなる、脈がとぶ、脈が速くなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

販売名	ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg 「タカタ」
PTP シート	 表面  裏面
形状	白色の裸錠 
直径	6.6mm
厚さ	2.9mm
重さ	0.1g
色	白色

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg 「タカタ」
有効成分	ゾルミトリプタン
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、クロスポビドン、アセスルファムカリウム、スクラロース、香料、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：高田製薬株式会社

(<http://www.takata-seiyaku.co.jp>)

学術部

電話：0120-989-813

受付時間：8 時 30 分～17 時 20 分

（土、日、祝祭日、弊社休業日を除く）