

シロスタゾール OD 錠 50mg 「タカタ」 シロスタゾール OD 錠 100mg 「タカタ」

【この薬は？】

販売名	シロスタゾール OD 錠 50mg 「タカタ」 Cilostazol OD Tablets 50	シロスタゾール OD 錠 100mg 「タカタ」 Cilostazol OD Tablets 100
一般名	シロスタゾール Cilostazol	
含有量 (1 錠中)	50mg	100mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗血小板剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、血液が固まるのを防ぎ、血管を広げ、血液の流れをよくして、足の痛みや冷え等の症状を改善する働きがあります。
- ・この薬は、脳梗塞の症状が落ち着いたあとの再発を抑える働きがあります。
- ・次の目的で処方されます。

**慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改善
脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）発症後の再発抑制**

- ・この薬は、体調がよくなったと自分の判断で使用を止めたり、量を加減したりすると、病気が悪化したり、再発することがあります。指示どおりに使用することが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬の使用中に脈拍数が増えることがあり、冠動脈疾患を合併している人では、狭心症（胸痛など）を引き起こすおそれがあります。[この薬の使用中に気をつけなければならないことは？]をよくお読みください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・出血している人
 - ・うっ血性心不全の人
 - ・過去にシロスタゾール OD 錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
 - ・血液が固まるのを防ぐ、または固まった血液を溶かす薬（抗凝固剤、血小板凝集を抑制する薬剤、血栓溶解剤、プロスタグランジン E₁ 製剤およびその誘導体）を服用している人
 - ・月経期間中の人
 - ・出血しやすい人
 - ・冠動脈狭窄のある人
 - ・糖尿病あるいは耐糖能異常のある人
 - ・肝臓に重篤な障害がある人
 - ・腎臓に障害がある人
 - ・持続して血圧が上昇している高血圧（悪性高血圧等）の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	シロスタゾール OD 錠 50mg 「タカタ」	シロスタゾール OD 錠 100mg 「タカタ」
1 回量	2 錠	1 錠
飲む回数	1 日 2 回	1 日 2 回

●どのように飲むか？

- ・この薬は、口の中で溶かして飲む薬です。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。唾液だけでは飲み込めない場合は、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲み込んでください。
- ・この薬は寝たままの状態では飲まないでください。
- ・グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。同時に飲むと薬の作用が強くなるおそれがあります。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用中に脈拍数が増えることがあり、冠動脈疾患を合併している人では、狭心症を引き起こすおそれがあるので、胸痛等気になる症状があらわれた場合は医師に伝えてください。
- ・授乳を避けてください。
- ・けがをしないように注意してください。出血した場合、血が止まりにくくなっています。出血が長引く場合やけがの範囲が大きい場合は、ただちに受診してください。
- ・手術や歯の治療などを受ける場合、必ずこの薬を飲んでいることを医師に伝えてください。
- ・風邪などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを薬局の薬剤師に伝えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
うつ血性心不全 うつけつせいしんふぜん	からだがだるい、全身のむくみ、吐き気、息苦しい、動く時の息切れ
心筋梗塞 しんきんこうそく	冷や汗、急激に胸を強く押さえつけられた感じ、狭心痛、息苦しい
狭心症 きょうしんしょう	冷や汗、胸がしめつけられる感じ、胸が押しつぶされるような感じ、胸の痛み、胸を強く押さえつけた感じ
心室頻拍 しんしつひんぱく	息切れ、動悸（どうき）、脈が速くなる

重大な副作用	主な自覚症状
出血（脳出血等の頭蓋内出血、肺出血、消化管出血、鼻出血、眼底出血） しゅっけつ（のうしゅっけつなどのとうがいない（ずがいない）しゅっけつ、はいしゅっけつ、しょうかかんしゅっけつ、びしゅっけつ、がんでいしゅっけつ）	出血、片側のまひ、意識の低下、考えがまとまらない、頭痛、しゃべりにくい、嘔吐（おうと）、吐き気、手足のまひ、しびれ、半身不随、意識を失って深く眠りこむ、判断力の低下、運動のまひ、意識がうすれる、突然の頭痛、血の混じった痰、血を吐く、腹痛、血が混ざった便、黒色便、鼻血、視力の低下、明るい壁面を見たとき蚊が飛んでいるように感じる
胃・十二指腸潰瘍 い・じゅうにしちようかいよう	吐き気、嘔吐（おうと）、腹痛、血が混ざった便、便が黒くなる
汎血球減少 はんけつきゅうげんしょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸（どうき）、あおあざができる、出血しやすい
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	発熱、から咳、息苦しい、息切れ
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
急性腎不全 きゅうせいじんふぜん	からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい、意識の低下、頭痛、眼がはれぼったい、息苦しい、尿がでない、尿量が減る

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、冷や汗、発熱、全身のむくみ、運動のまひ、片側のまひ、からだのむくみ、疲れやすい
頭部	突然の頭痛、意識がうすれる、考えがまとまらない、めまい、頭痛、意識の低下
顔面	鼻血
眼	白目が黄色くなる、視力の低下、明るい壁面を見たとき蚊が飛んでいるように感じる、眼がはれぼったい
耳	耳鳴り
口や喉	吐き気、嘔吐（おうと）、歯ぐきの出血、血を吐く、から咳、のどの痛み、血の混じった痰、しゃべりにくい
胸部	吐き気、動悸（どうき）、息切れ、動く時の息切れ、息苦しい、胸を強く押さえつけた感じ、狭心痛、胸がしめつけられる感じ、胸の痛み、胸が押しつぶされるような感じ、急激に胸を強く押さえつけられた感じ

部位	自覚症状
腹部	吐き気、食欲不振、腹痛
手・足	脈が速くなる、片側のまひ、半身不随、手足のまひ、しびれ
皮膚	かゆみ、皮膚が黄色くなる、あおあざができる、皮下出血
便	血が混ざった便、黒色便、便が黒くなる
尿	尿が褐色になる、尿の色が濃くなる、尿がでない、尿量が減る
その他	出血しやすい、しゃべりにくい、判断力の低下、意識を失って深く眠りこむ、出血、出血が止まりにくい

【この薬の形は？】

販売名	シロスタゾール OD 錠 50mg 「タカタ」	シロスタゾール OD 錠 100mg 「タカタ」
PTP シート		
形状	円形の錠剤 	円形の錠剤 
直径	約 7.0mm	約 9.1mm
厚さ	約 2.9mm	約 3.8mm
重さ	約 125mg	約 250mg
色	白色	白色

【この薬に含まれているのは？】

販売名	シロスタゾール OD 錠 50mg 「タカタ」	シロスタゾール OD 錠 100mg 「タカタ」
有効成分	シロスタゾール (1錠中 50mg 含有)	シロスタゾール (1錠中 100mg 含有)
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、アセスルファムカリウム、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム	乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、アセスルファムカリウム、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：高田製薬株式会社

(<http://www.takata-seiyaku.co.jp>)

学術部

電話：0120-989-813

受付時間：8時30分～17時20分

（土、日、祝祭日、弊社休業日を除く）