

ラジカット注 30mg

【この薬は？】

販売名	ラジカット注 30mg RADICUT injection 30mg
一般名	エダラボン Edaravone
含有量 [1管 (20mL) 中]	30mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、フリーラジカルスカベンジャーと呼ばれる薬です。
- ・この薬は、フリーラジカル*を消去することにより、脳細胞（血管内皮細胞・神経細胞）や神経細胞の酸化による傷害を抑える作用があります。

*フリーラジカル：細胞を構成している脂質を過酸化することにより、細胞膜傷害や脳機能障害を引き起こしたり、酸化ストレスを生じ、筋萎縮性側索硬化症（ALS）の発症や病勢進展などに関与したりすると考えられています。

- ・次の目的で使用されます。

**脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善
筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制**

- ・ALSに使用する場合、ALS重症度分類4度以上の人、努力性肺活量が理論正

常値の70%未満に低下している人での有効性や安全性は確立していません。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 重篤な腎機能障害のある人
- ・ 過去にラジカットに含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・ 脱水症状のある人
- ・ 感染症のある人
- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 高度な意識障害（刺激しても眼を覚まさない）のある人（脳梗塞急性期に使用した場合）
- ・ 腎臓に障害のある人（重篤な腎機能障害のある人は、この薬を使用することはできません。）
- ・ 肝臓に障害のある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・ 授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○この薬の使用前に腎機能検査、肝機能検査、血液検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

この薬は、注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 過度の使用により重篤な副作用があらわれることがあるので、患者さんまたは家族の方は、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・ 急性腎障害または腎機能障害の増悪、重篤な肝障害、播種性血管内凝固症候群（DIC）があらわれ、死亡に至ることがあります。これらの症例では、腎機能障害、肝機能障害、血液障害などを同時に発現する重篤な症例が報告されています。
- ・ 使用中は頻回に腎機能検査、肝機能検査、血液検査を実施します。
- ・ 脱水症状のある人、感染症にかかっている人（特に抗生物質を併用した場合）、高度な意識障害（刺激しても眼を覚まさない）のある人（脳梗塞急性期に使用した場合）、高齢の人では、死亡に至る例が多く報告されています。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。

- ・ 授乳している人は医師に相談してください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
ネフローゼ症候群 ネフローゼしょうこうぐん	尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、息苦しい、尿が赤みを帯びる、むくみ、体がだるい、体重の増加
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、唾液・痰に血が混じる、血を吐く、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
顆粒球減少 かりゅうきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
播種性血管内凝固症候群 (DIC) はしゅせいけっかんないぎょうこしょうこうぐん (ディーアイシー)	あおあざができる、鼻血、歯ぐきからの出血、血尿、便に血が混じる、意識の低下、息切れ、動悸、尿量が減る、皮膚が黄色くなる、白目が黄色くなる
急性肺障害 きゅうせいはいしょうがい	発熱、咳、痰、息苦しい、息切れ
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
ショック ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	むくみ、体がだるい、体重の増加、体がかゆくなる、急激に体重が増える、疲れやすい、力が入らない、出血が止まりにくい、突然の高熱、寒気、発熱、脱力感、冷汗が出る、ふらつき

頭部	急な意識の低下、意識の低下、めまい、意識の消失
顔面	鼻血、顔面蒼白（そうはく）
眼	白目が黄色くなる
口や喉	唾液・痰に血が混じる、血を吐く、吐き気、歯ぐきからの出血、喉の痛み、咳、痰、喉のかゆみ
胸部	息苦しい、息切れ、動悸
腹部	お腹が張る、食欲不振
手・足	手足のこわばり、手足のしびれ、手足が冷たくなる
皮膚	皮膚が黄色くなる、あおあざができる、全身のかゆみ、じんま疹
筋肉	筋肉の痛み
便	便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
尿	尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、尿が赤みを帯びる、尿の色が濃くなる、血尿、尿が赤褐色になる

【この薬の形は？】

性状	無色澄明・水性注射剤
形状	注射剤 

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	エダラボン 30mg
添加剤	亜硫酸水素ナトリウム、L-システイン塩酸塩水和物

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：田辺三菱製薬株式会社

(<https://www.mt-pharma.co.jp>)

くすり相談センター

電話：0120-331-195

受付時間：9時～17時30分
(土、日、祝日、会社休業日を除く)