

患者向医薬品ガイド

2024年8月更新

タリージェ錠 2.5mg タリージェ OD錠 2.5mg
タリージェ錠 5mg タリージェ OD錠 5mg
タリージェ錠 10mg タリージェ OD錠 10mg
タリージェ錠 15mg タリージェ OD錠 15mg

【この薬は？】

販売名	タリージェ錠 2.5mg Tarlige Tablets 2.5mg	タリージェ錠 5mg Tarlige Tablets 5mg	タリージェ錠 10mg Tarlige Tablets 10mg	タリージェ錠 15mg Tarlige Tablets 15mg
一般名	ミロガバリンベシル酸塩 Mirogabalin Besilate			
含有量 (1錠中)	ミロガバリンベ シル酸塩 4.39mg (ミロガバリン として2.5mg)	ミロガバリンベ シル酸塩 8.78mg (ミロガバリン として5mg)	ミロガバリンベ シル酸塩 17.56mg (ミロガバリン として10mg)	ミロガバリンベ シル酸塩 26.34mg (ミロガバリン として15mg)

販売名	タリージェ OD錠 2.5mg Tarlige OD Tablets 2.5mg	タリージェ OD錠 5mg Tarlige OD Tablets 5mg	タリージェ OD錠 10mg Tarlige OD Tablets 10mg	タリージェ OD錠 15mg Tarlige OD Tablets 15mg
一般名	ミロガバリンベシル酸塩 Mirogabalin Besilate			
含有量 (1錠中)	ミロガバリンベ シル酸塩 4.39mg (ミロガバリン として2.5mg)	ミロガバリンベ シル酸塩 8.78mg (ミロガバリン として5mg)	ミロガバリンベ シル酸塩 17.56mg (ミロガバリン として10mg)	ミロガバリンベ シル酸塩 26.34mg (ミロガバリン として15mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、神経障害性疼痛治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、神経でのカルシウムイオンの流入を抑えることで、神経伝達物質の放出を抑制し、鎮痛作用を発揮します。
- ・次の病気の人に処方されます。

神経障害性疼痛

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、不眠、吐き気、下痢、食欲不振などの症状があらわれることがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にタリージェ錠に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・腎臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

- ・高齢の人や腎臓に障害のある人は、飲む量と回数が調節されます。

- ・通常、成人の飲む量および回数は次のとおりです。有効用量は、年齢、症状により適宜増減されます。

	初期用量	有効用量
1回量	5mg	10mg～15mg
飲む回数	1日2回	

- ・飲み始めてから、1週間以上の間隔をあけて1回量5mgずつ増量されます。

●どのように飲むか？

[タリージェ錠 2.5mg、5mg、10mg、15mg]

- ・コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

[タリージェOD錠 2.5mg、5mg、10mg、15mg]

- ・口の中で溶かして飲む薬です。舌の上へのせ唾液で湿らせて舌で軽くつぶし、水なしで飲むことができます。また、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- ・口の中で速やかに崩壊しますが、口の粘膜からの吸収により効果発現を期待する薬ではないため、崩壊後は唾液や水またはぬるま湯で飲み込んでください。
- ・寝たまま飲む場合は、水またはぬるま湯と一緒に飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

多幸気分、構語障害、頭痛、嚥下障害（食べ物や水が上手く飲み込めずむせる）、関節炎（関節のはれ）、関節腫脹、無力症などの症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・めまい、傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、意識消失などがあらわれることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。特に高齢の人では、これらの症状により転倒し骨折するおそれがありますので、注意してください。
- ・体重が増加することがあるので、肥満に注意してください。特に飲んでいいる量を増やした場合や長期間飲んでいいる場合に、体重が増加することが多いので、定期的に体重測定を行い、体重が増加し始めた場合には、医師に相談してください。食事内容の改善や運動などがすすめられることもあります。
- ・突然この薬を中止すると、不眠、吐き気、下痢、食欲不振などの症状があらわれることがありますので、この薬の使用を中止する場合は時間をかけて徐々に

減量していきます。自己判断でこの薬を減量したり、やめたりしないでください。

- ・弱視、視覚異常、霧視（霧がかかったような見え方）、複視などの症状があらわれることがありますので、このような症状があらわれた場合は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、飲酒を控えてください。
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人は、医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
めまい	宙に浮いた感じ、ふらつき、頭が回っている感じ
傾眠 けいみん	刺激がないと眠ってしまう
意識消失 いしきしょうしつ	意識の消失
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
腎機能障害 じんきのうしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	宙に浮いた感じ、ふらつき、疲れやすい、体がだるい、力が入らない、食欲不振、むくみ
頭部	頭が回っている感じ、刺激がないと眠ってしまう、意識の消失
口や喉	吐き気
尿	尿量が減る

【この薬の形は？】

販売名	タリージェ錠 2.5mg	タリージェ錠 5mg	タリージェ錠 10mg	タリージェ錠 15mg
PTPシート				
				
形状				
長径 (mm)	6.7 (直径)	10.8	12.2	12.2
短径 (mm)		5.7	6.5	6.5
厚さ (mm)	3.4	3.8	4.4	4.4
色	淡赤白色	赤白色	淡赤白色	赤白色

販売名	タリージェ OD錠 2.5mg	タリージェ OD錠 5mg	タリージェ OD錠 10mg	タリージェ OD錠 15mg
PTPシート				
				
形状				
直径 (mm)	6.6	7.1	8.1	9.6
厚さ (mm)	2.8	2.8	4.1	4.5
色	淡黄白色	白色	淡黄白色	白色

【この薬に含まれているのは？】

販売名	タリージェ錠 2.5mg	タリージェ錠 5mg	タリージェ錠 10mg	タリージェ錠 15mg
有効成分	ミロガバリンベシル酸塩			
添加剤	D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、トコフェロール、クエン酸水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄			

販売名	タリージェ OD錠 2.5mg	タリージェ OD錠 5mg	タリージェ OD錠 10mg	タリージェ OD錠 15mg
有効成分	ミロガバリンベシル酸塩			
添加剤	D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トコフェロール、クエン酸水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、アルファー化デンプン、クロスポビドン、アセスルファミカリウム、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄*			

※OD錠 2.5mg、OD錠 10mg

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：第一三共株式会社 (<https://www.daiichisankyo.co.jp/>)

製品情報センター

電話：0120-693-132

受付時間：9:00～17:30

（土、日、祝日、当社休日を除く）