

患者向医薬品ガイド

2024年4月更新

レミニール錠 4mg レミニール OD 錠 4mg
 レミニール錠 8mg レミニール OD 錠 8mg
 レミニール錠 12mg レミニール OD 錠 12mg
レミニール内用液 4mg/mL

【この薬は？】

販売名	レミニール錠 4mg REMINYL Tablets 4mg	レミニール錠 8mg REMINYL Tablets 8mg	レミニール錠 12mg REMINYL Tablets 12mg
一般名	ガラントミン臭化水素酸塩 Galantamine Hydrobromide		
含有量 (1錠中)	ガラントミン 臭化水素酸塩5.1mg (ガラントミンとして 4mg) 含有	ガラントミン 臭化水素酸塩10.3mg (ガラントミンとして 8mg) 含有	ガラントミン 臭化水素酸塩15.4mg (ガラントミンとして 12mg) 含有

販売名	レミニールOD錠 4mg REMINYL OD Tablets 4mg	レミニールOD錠 8mg REMINYL OD Tablets 8mg	レミニールOD錠 12mg REMINYL OD Tablets 12mg
一般名	ガラントミン臭化水素酸塩 Galantamine Hydrobromide		
含有量 (1錠中)	ガラントミン 臭化水素酸塩5.1mg (ガラントミンとして 4mg) 含有	ガラントミン 臭化水素酸塩10.3mg (ガラントミンとして 8mg) 含有	ガラントミン 臭化水素酸塩15.4mg (ガラントミンとして 12mg) 含有

販売名	レミニール内用液4mg/mL REMINYL Oral Solution 4mg/mL
一般名	ガラントミン臭化水素酸塩 Galantamine Hydrobromide
含有量 (1mL中)	ガラントミン臭化水素酸塩5.1mg (ガラントミンとして4mg) 含有

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アルツハイマー型認知症治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、アセチルコリン（脳内の神経伝達物質）を分解する酵素の働きを抑えてその減少を防いだり、アセチルコリンの作用を増強したりして、認知症症状の進行を遅らせます。
- ・次の目的で処方されます。

軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にレミニールに含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・心臓に障害（心筋梗塞、弁膜症、心筋症など）のある人、電解質異常（低カリウム血症など）のある人
- ・洞不全症候群または伝導障害などの心臓に障害のある人
- ・過去に消化性潰瘍があった人、消化管閉塞のある人、消化管手術直後の人
- ・下部尿路閉塞のある人、膀胱手術直後の人
- ・てんかんなどのけいれんをおこす疾患にかかっている人、または過去におこしたことがある人
- ・過去に気管支喘息や閉塞性肺疾患があった人
- ・錐体外路障害（パーキンソン病、パーキンソン症候群など）のある人

- ・腎臓に障害のある人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

[通常]

	飲み始めから 4 週間	4 週間後～
1 日量	8mg	16mg
飲む回数	1 日 2 回食後	
最高量	1 日量として 24mg	

- ・増量が必要な場合、4週間以上同じ用量を飲んだ後、増量されます。

[肝臓に障害がある場合]

	飲み始めから 1 週間以上	1 週間後～
1 日量	4mg	8mg
飲む回数	1 日 1 回食後	1 日 2 回食後
最高量	1 日量として 16mg	

- ・増量が必要な場合、4週間以上同じ用量を飲んだ後、増量されます。

●どのように飲むか？

[レミニール錠 4mg、8mg、12mg]

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

[レミニール OD 錠 4mg、8mg、12mg]

舌の上のにせ唾液で湿らせて舌で軽くつぶし、水なしで飲むことができます。

また、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。

寝たままの状態では、水なしで飲まないようにしてください。

[レミニール内用液 4mg/mL]

- ・ゆっくりと袋をしぼるように、切り口から直接飲んでください。
- ・目、鼻、耳に使用しないでください。
- ・開封後はすみやかに全量を服用してください。包装ごと飲まないようにしてください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

筋力低下、筋肉のけいれん、重度の吐き気、嘔吐（おうと）、消化管けいれん、よだれがでる、涙が止まりにくい、排尿、排便、発汗、徐脈、低血圧、虚脱（冷汗が出る、顔面蒼白（そうはく）、脱力感、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失、めまい）、けいれんなどがあらわれる可能性があります。これらの症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・アルツハイマー型認知症では運転能力や機械操作能力が徐々に低下し、また、この薬の使用により、めまい、眠気がおこることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。特に、使用し始めから数週間は注意してください。
- ・この薬の使用により、体重が減少することがあります。また、アルツハイマー型認知症でも体重が減少することがあるので、体重が減った場合は、医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
失神 しっしん	短時間、意識を失い倒れる
徐脈 じよみやく	めまい、立ちくらみ、息切れ、脈がとぶ、脈が遅くなる、気を失う
心ブロック しんブロック	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
QT延長（心電図の異常） キューティーエンちょう（しんでんずのいじょう）	動悸（どうき）、めまい、気を失う
急性汎発性発疹性膿疱症 きゅうせいはんぱつせいほっしんせい のうほうしょう	発熱、皮膚が広い範囲で赤くなる、ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る

重大な副作用	主な自覚症状
肝炎 かんえん	体がだるい、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手足のこわばり、手足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる


以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、発熱、脱力感、体がかゆくなる
頭部	短時間、意識を失い倒れる、めまい、立ちくらみ、気を失う
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気、嘔吐
胸部	息切れ、動悸
腹部	食欲不振、上腹部痛
手・足	脈がとぶ、脈が遅くなる、手足のしびれ、手足のこわばり
皮膚	皮膚が広い範囲で赤くなる、ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る、皮膚が黄色くなる
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる

【この薬の形は？】

販売名	レミニール錠 4mg	レミニール錠 8mg	レミニール錠 12mg
PTPシート	 表面	 表面	 表面
	 裏面	 裏面	 裏面
形状	フィルム コーティング錠 	フィルム コーティング錠 	フィルム コーティング錠 
直径(mm)	5	7	8
厚さ(mm)	2.8	3.1	3.6
重さ(mg)	64.4	127.0	189.3
色	淡黄色	桃色	白色～淡黄色
識別記号	JANSSEN G4	JANSSEN G8	JANSSEN G12

販売名	レミニール OD錠 4mg	レミニール OD錠 8mg	レミニール OD錠 12mg
PTPシート	 表面	 表面	 表面
	 裏面	 裏面	 裏面
形状	素錠 (口腔内崩壊錠) 	素錠 (口腔内崩壊錠) 	素錠 (口腔内崩壊錠) 
直径(mm)	7	7	8
厚さ(mm)	2.9	2.9	3.4
重さ(mg)	140	140	210
色	微黄色	微赤色	白色
識別記号	JP110	JP111	JP112

販売名	レミニール内用液 4mg/mL		
形状	分包品（アルミラミネート製）		
	1mL	2mL	3mL
			
識別記号	TYP115	TYP116	TYP117

・薬液は無色です。

【この薬に含まれているのは？】

	レミニール錠 4mg	レミニール錠 8mg	レミニール錠 12mg
有効成分	ガランタミン臭化水素酸塩		
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスポリドン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酸化チタン、タルク、黄色三二酸化鉄	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスポリドン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスポリドン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酸化チタン、タルク

	レミニール OD錠 4mg	レミニール OD錠 8mg	レミニール OD錠 12mg
有効成分	ガランタミン臭化水素酸塩		
添加剤	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、カルメロース、デンプングリコール酸ナトリウム、アスパルテム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、カルメロース、デンプングリコール酸ナトリウム、アスパルテム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、カルメロース、デンプングリコール酸ナトリウム、アスパルテム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

	レミニール内用液 4mg/mL
有効成分	ガランタミン臭化水素酸塩
添加剤	パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、サッカリンナトリウム水和物、水酸化ナトリウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
[OD錠] 高温多湿を避けて保管してください。
[内用液] 凍結を避けて保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：太陽ファルマ株式会社

(<https://www.taiyo-pharma.co.jp/>)

お客様相談室

電話：0120-533-030

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、会社休日を除く）