2025 年 4 月更新

ラベプラゾールNa錠5mg「AA」 ラベプラゾールNa錠10mg「AA」

【この薬は?】

販売名	ラベプラゾールNa錠5mg「AA」 RABEPRAZOLE Na TABLETS 5mg	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 RABEPRAZOLE Na TABLETS 10mg
一般名	ラベプラゾールナトリウム Rabeprazole Sodium	
含有量 (1 錠中)	5mg	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解 と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤 師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。 さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」 https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は?】

- ・この薬は、プロトンポンプ阻害剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は胃の中で、酸分泌を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger - Ellison 症候群、非びらん性胃食道逆流症、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制

下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期 胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎

・この薬は、体調がよくなったと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると 病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは?】

- ○次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にラベプラゾールNa錠「AA」に含まれる成分に対して過敏な反応を経験したことがある人
 - ・リルピビリン塩酸塩を使用している人
- ○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
 - ・過去に薬剤で過敏症のあった人
 - ・肝臓に障害のある人
- ○この薬には併用してはいけない薬 [リルピビリン塩酸塩(エジュラント)]や併用 を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、 必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は?】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量、回数および期間は次のとおりです。

[胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群]

1 回量	10mgまたは20mg	
飲む回数	1日1回	
名かよる廿日月日	胃潰瘍、吻合部潰瘍	8週間まで
飲む期間	十二指腸潰瘍	6週間まで

[逆流性食道炎の治療]

	1回量	10mgまたは20mg
通常	飲む回数	1日1回
	飲む期間	8週間まで
プロトンポンプ阻害剤	1回量	10mgまたは20mg*1
による治療で	飲む回数	1日2回
効果不十分な場合	飲む期間	さらに8週間

^{*1} 重度の粘膜傷害を有する場合に限り、1回20mgを1日2回飲みます。

[逆流性食道炎の維持療法]

再発・再燃を繰り返す	1回量	10mg
逆流性食道炎	飲む回数	1日1回
プロトンポンプ阻害剤	1回量	10mg
による治療で効果不十		
分な逆流性食道炎	飲む回数	1日2回

[非びらん性胃食道逆流症]

1 回量	10mg
飲む回数	1日1回
飲む期間	4週間まで

[低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制]

1 回量	5mgまたは10mg
飲む回数	1日1回

[ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助]

1 回量	以下の3剤を同時に飲みます。 ラベプラゾールナトリウムとして 10mg アモキシシリン水和物として 750mg (力価) クラリスロマイシンとして200mg又は400mg (力価)
飲む回数	1 日 2 回
飲む期間 7日間	

[ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 (除菌不成功の場合)]

	以下の 3 剤を同時に飲みます。
4 I I	ラベプラゾールナトリウムとして 10mg
1回量	アモキシシリン水和物として 750mg (力価)
	メトロニダゾールとして 250mg
飲む回数	1日2回
飲む期間	7日間

●どのように飲むか?

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時(過量使用時)の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・この薬の使用中に血液検査が行われることがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を

副作用は?

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。 副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いく つかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	、たたりに医師または楽角師に相談してくたさい。 主な自覚症状
ショック	上で日光型状
V = 97	
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸 (どうき)、 息苦しい
汎血球減少 はんけっきゅうげんしょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸 (どうき)、 あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる(鮮紅色~暗赤色または黒色)
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体が かゆくなる
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
中毒性表皮壊死融解 症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえし ゆうかいしょう (テン)	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、 粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症 候群) ひふねんまくがんしょうこう ぐん(スティーブンス・ジョ ンソンしょうこうぐん)	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部 にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多 発する、発熱、関節や喉の痛み
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
間質性腎炎 かんしつせいじんえん	発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐(おうと)、下痢、腹痛、むくみ、尿量が減る
低ナトリウム血症 ていナトリウムけっしょう	吐き気、頭痛、嘔吐(おうと)、けいれん、意識の低下

重大な副作用	主な自覚症状		
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる		
視力障害 しりょくしょうがい	文字や形がみえにくい、視野の異常		
錯乱状態 さくらんじょうたい	注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動に まとまりがない		

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、発熱、ふらつき、出血が止まりにくい、突然の高熱、寒気、 出血しやすい、体がだるい、けいれん、脱力感、むくみ、体がかゆくな る、疲れやすい、力が入らない、急激に体重が増える
頭部	めまい、意識の消失、頭痛、意識の低下、注意力が散漫になる、問いかけ
	に間違った答えをする、行動にまとまりがない、急な意識の低下
顔面	顔面蒼白、鼻血
眼	目の充血やただれ、白目が黄色くなる、文字や形がみえにくい、視野の異常
耳	耳鳴り
口や喉	咳、唇や口内のただれ、喉のかゆみ、歯ぐきの出血、喉の痛み、吐き気、 嘔吐(おうと)、血を吐く
胸部	息切れ、息苦しい、動悸 (どうき)
腹部	腹痛、食欲不振、お腹が張る
手・足	手足が冷たくなる、関節や喉の痛み、手足のこわばり、手足のしびれ、関 節の痛み
皮膚	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、
	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただ
	れ、全身のかゆみ、じんま疹、あおあざができる、皮膚が黄色くなる、
	発疹
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる、尿量が減る
便	下痢、便に血が混じる(鮮紅色~暗赤色または黒色)

【この薬の形は?】

販売名	ラベプラゾールNa錠5mg「AA」	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」
PTP シート	ラベフラゾールNa毀5mg「AA」 (5) AK339 (5) AK339 ラベブラゾール ラベブラゾール 表面 RABEPRAZOLE Na TABLETS 5mg ラベブラゾールNa毀 ラベブラゾールNa毀 5mg「AA」 「5] 「5] 「5] 「1011040877323515521 「101104087752773251 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「1011040877723515521 「10110408772351521 「10110408772351 「10110408	ラベフラゾールNag 10mg「AA」 ① AK239 ① AK239 ラベフラゾール ラベプラゾール 表面 RABEPRAZOLE Na TABLETS 10mg ラベブラゾールNag 10mg「AA」 10mg「AA」 10mg「AA」 10mg「AA」 10mg「AA」 10mg「AA」
形状	腸溶フィルムコーティング錠 AK 339 AK 339	腸溶フィルムコーティング錠
直径	5.7mm	6.7mm
厚さ	2.7mm	3.7mm
重さ	67mg	132mg
色	淡黄色	
識別コード	AK339	AK239

【この薬に含まれているのは?】

販売名	ラベプラゾールNa錠5mg「AA」	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」
有効成分	日本薬局方 ラベプラゾールナトリウム	
添加剤	D-マンニトール、酸化マグネシウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ	

【その他】

●この薬の保管方法は?

- ・直射日光と湿気を避けて室温(1~30℃)で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら?

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は?】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師に お尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社:あすか製薬株式会社(https://www.aska-pharma.co.jp/)

くすり相談室

電話: 0 1 2 0-8 4 8-3 3 9 受付時間: 9:00~17:30

(土・日・祝日および当社休日を除く)