

ワクチン接種を受ける人へのガイド

2022年4月更新

沈降破傷風トキソイド

【このワクチンの名前は？】

販売名	沈降破傷風トキソイド「生研」 Adsorbed Tetanus Toxoid “SEIKEN”
一般名	沈降破傷風トキソイド Adsorbed Tetanus Toxoid

ワクチン接種を受ける人へのガイドについて

ワクチンの正しい理解と、重大な副反応の早期発見などに役立てていただくために、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、特に知っていただきたいことをわかりやすく記載しています。添付文書情報はPMDAホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載されています。
※副反応：ワクチンの副作用のこと

【このワクチンの効果は？】

- ・ このワクチンは、次の目的で接種されます。
破傷風の予防
- ・ このワクチンの接種により破傷風に対する抗体ができ、かかりにくくなります。

【このワクチンの接種前に、確認すべきことは？】

- ワクチン接種を受ける人または家族の方などは、このワクチンの効果や副反応などの注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した上で接種を受けてください。
- 医師が問診、検温および診察の結果から、接種できるかどうか判断します。
- 次の人は、このワクチンの接種を受けることはできません。
 - ・ 明らかに発熱（通常37.5℃以上）している人
 - ・ 重篤な急性疾患にかかっている人
 - ・ 過去にこのワクチンに含まれている成分でアナフィラキシーをおこしたことがある人
 - ・ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適当な状態にあると判断した人

- 次の人は、医師が健康状態や体質に基づいて、接種の適否を判断します。
 - ・ 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の障害や発育の障害などの基礎疾患がある人
 - ・ 他のワクチンの接種を受けて、2日以内に発熱があった人や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある人
 - ・ 過去にけいれんをおこしたことがある人
 - ・ 過去に免疫に異常があると診断されたことがある人や両親や兄弟に先天性免疫不全症の人がいる人
 - ・ このワクチンに含まれている成分に対してアレルギーをおこすおそれがある人
 - ・ 抗凝固療法を受けている人、または血小板減少症や凝固障害のある人
 - ・ 腎臓に障害のある人
 - ・ 肝臓に障害のある人
 - ・ 高齢の人
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。

【このワクチンの接種スケジュールは？】

● 接種量および回数

接種量 1回0.5mL

	接種回数	接種部位
初回免疫	3週間～8週間間隔で2回	皮下または筋肉内
追加免疫	初回免疫から6ヶ月以上経過後1回	
再追加免疫	初回免疫、追加免疫を完了後、数年ごとに1回 接種間隔は職業、スポーツ等の実施状況が考慮されます。	
初回免疫、追加免疫、または再追加免疫を受けた人	破傷風感染のおそれのある負傷を受けたときは直ちに1回接種を受けて下さい。	

- 医師が必要と認めた場合には、同時に他のワクチンの接種を受けることができます。

【このワクチンの接種後に気をつけなければならないことは？】

- ・ 接種当日は激しい運動をさけ、接種部位を清潔に保ってください。
- ・ 接種後は健康状態によく気をつけてください。接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 接種後に、アナフィラキシー（全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しいなど）がおこることがあります。アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多いので、この間接種施設で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておいてください。
- ・ このワクチンはチメロサール（添加剤）を含んでいます。チメロサールを含む製剤で、過敏症（発熱、発疹、じんま疹、紅斑、かゆみなど）があらわれたとの報告があります。これらの症状があらわれたら医師の診察を受けてください。
- ・ 他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこのワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

副反応は？


特にご注意いただきたい重大な副反応と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副反応であれば、それぞれの重大な副反応ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師に相談してください。

重大な副反応	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

以上の自覚症状を、副反応のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副反応ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき
頭部	めまい、意識の消失
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【このワクチンの形は？】

容器の形状	性状
	不溶性で、振り混ぜるとき均等に白濁する液剤です。

写真はほぼ原寸大です。

【このワクチンに含まれているのは？】

有効成分	破傷風トキソイド
添加剤	塩化アルミニウム（Ⅲ）六水和物、ホルマリン、チメロサール、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素カリウム

【このワクチンについてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副反応などのより詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元：デンカ株式会社 ワクチン学術担当

フリーダイヤル 0120-206-071

<https://www.denka.co.jp/>

発売元：田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター

電話 0120-753-280

受付時間 9時～17時30分（土日祝日・会社休業日を除く）

<https://www.mt-pharma.co.jp/>