

リバルエン LA パッチ 25.92mg

リバルエン LA パッチ 51.84mg

【この薬は？】

販売名	リバルエン LA パッチ 25.92mg RIVALUEN LA PATCH 25.92mg	リバルエン LA パッチ 51.84mg RIVALUEN LA PATCH 51.84mg
一般名	リバスチグミン Rivastigmine	
含有量 (1 枚中)	25.92mg	51.84mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アルツハイマー型認知症治療剤の中の、コリンエステラーゼ阻害剤に属する貼り薬です。
- ・この薬は、脳内のアセチルコリン量を増加させ、認知症症状の進行を抑制します。
- ・次の目的で処方されます。

軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

- ・この薬は、体調がよくなったと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にリバルエン LA パッチに含まれる成分やカルバメート系誘導体で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。


- ・洞不全症候群または伝導障害等の心臓病のある人
- ・心筋梗塞、弁膜症、心筋症等の心臓病や電解質異常（低カリウム血症等）等のある人。QT延長のある人、または過去に経験したことがある人、血縁にQT延長のある人がいる人
- ・胃潰瘍や十二指腸潰瘍のある人、または過去に経験したことがある人
- ・尿路閉塞のある人やなりやすい人
- ・てんかん等のけいれん性疾患のある人、または過去に経験したことがある人
- ・気管支喘息や閉塞性肺疾患のある人、または過去に経験したことがある人
- ・錐体外路障害（パーキンソン病、パーキンソン症候群等）のある人
- ・低体重の人
- ・肝臓に重い障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
- ・通常、成人には1回 25.92mg から開始し、原則として4週後に維持量である1回 51.84mg に増量します。
- ・この薬は背中、上腕、胸のいずれかの正常で健康な皮膚に貼ります。原則として開始時は4日間貼付し、3～4日ごとに1回（週2回）、新しいパッチに貼り替えます。
- ・この薬は原則として決めた曜日（週2回）に貼り替えます。



●どのように使用するか？

〔貼る時の注意点〕

- ・必ず古い薬をはがしてから、新しい薬を貼ってください。一度に2枚以上貼らないでください。
- ・あらかじめ貼る場所を乾いたタオルなどでふいて、水分や汗をよく取り除いてください。

〔貼る場所の注意点〕

- ・清潔で乾燥した場所、体毛が少ない場所、密着した衣服を着用してもこすれにくい場所に貼ってください。
- ・傷や皮膚に異常がある場所には貼らないでください。
- ・クリーム、ローション、パウダー、軟膏などをぬったばかりの場所ははがれやすくなります。乾いた場所に貼りましょう。
- ・貼る場所は毎回変え、同じ場所に続けて貼らないでください。

〔貼り方〕

	1 包装袋から薬を取り出す 内部のパッチを傷つけないように、包装袋の2ヵ所を番号順(①→②)に手で切り取り、中のパッチを取り出してください。手で切り取ることが難しい場合は、ハサミを使用して点線に沿って切って開封してください。
	2 曜日または日付を記入する パッチ表面に、左図のようにペンで記入して、(貼った日)⇒(貼りかえる日)が分かるようにしてください。 ※水性ペンにはじむことがあるため、油性ペンでご記入ください。
	3 透明フィルムを半分はがす パッチには透明フィルムがついています。粘着面に触れないように、透明フィルムの半分をはがしてください。 ※一度山折りすると、透明フィルムがはがれやすくなります。
	4 薬を貼る 粘着面を背中、上腕、胸のいずれかに押しあて、半分だけパッチを貼ってください。 貼った部分を押さえて、残りの透明フィルムをはがしながら貼ってください。
	5 薬を押さえる パッチがしっかりとくっつくまで、手のひらで押さえてください。



6 手を洗う

パッチを貼り終わったら、石けんで手を洗ってください。

手に薬がついていることもあるため、手を洗う前に目や口に触れないようにしてください。

●はがれそうなき、はがれた場合の対応

- ・薬が一部はがれそうなきときは、ばんそうこうなどではがれ落ちないように固定してください。
- ・薬がはがれた場合は、その時点で新しい薬に貼り替え、その後はあらかじめ決めた同じ曜日に貼り替えてください。

●使用し忘れた場合の対応

- ・貼り忘れに気づいたときは、気づいた時点で新しい薬を貼ってください。次からは、あらかじめ決めた曜日に貼り替えてください。貼り忘れに気づいても2枚以上を一度に貼ってはいけません。
- ・4日間以上貼っていない期間がある場合は、次に使うパッチの大きさが変わることがありますので、医師にご相談ください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

嘔吐（おうと）、悪心（吐き気、胸やけ、胃がむかむかする）、下痢、腹痛、めまい、振戦（手足のふるえ、首のふるえ）、頭痛、失神（短時間、意識を失い倒れる）、傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、錯乱状態（注意力が散漫になる、問いかげに間違った答えをする、行動にまとまりがない）、幻覚（実際には存在しないものを存在するかのよう感じる）、多汗症、徐脈（めまい、立ちくらみ、息切れ、脈がとぶ、脈が遅くなる、気を失う）、高血圧、けん怠感および縮瞳（しゅくどう）（ものの形が見えにくい）などの症状があらわれる可能性があります。重篤な場合は、筋力低下、けいれん、呼吸停止（呼吸が止まる）などがあらわれ、死にいたることがあります。これらの症状があらわれた場合は、速やかに本剤を全て除去し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・定期的に認知機能の検査が行われます。
- ・この薬を開始した時または増量したときにめまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転など、危険をとまなう機械の操作はしないよう注意してください。
- ・この薬を貼ることにより皮膚症状があらわれることがあるので、貼る箇所を毎回変更してください。
- ・貼り替えの際は先に貼っている薬を除去したことを十分確認してください。
- ・この薬の正しい使い方を守らなかった場合、重大な副作用があらわれることがあるので、患者さん、介護者の方は、使い方について十分に理解できるまで医師または薬剤師から説明を受けてください。

- ・嘔吐あるいは下痢が続くことにより脱水症状があらわれることがあります。このような場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・体重が減った場合は、医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
QT延長 キューティーえんちょう	めまい、動悸（どうき）、気を失う
狭心症 きょうしんしょう	しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、冷汗が出る、あごの痛み、左腕の痛み
心筋梗塞 しんきんこうそく	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷汗が出る
徐脈 じょみやく	めまい、立ちくらみ、息切れ、脈が遅くなる、脈がとぶ、気を失う
房室ブロック ぼうしつブロック	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
洞不全症候群 どうふぜんしょうこうぐん	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
脳卒中 のうそっちゅう	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる
痙攣発作 けいれんほっさ	顔や手足の筋肉がびくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
食道破裂を伴う重度の嘔吐 しょくどうはれつをともなうじゅうどのおうと	もどす、嘔吐、吐き気、胸やけ、血を吐く、腹痛
胃潰瘍 いはいよう	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（鮮紅色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、胃がむかむかする、黒い便が出る
十二指腸潰瘍 じゅうにしちようかいよう	腹痛、上腹部不快感、胃がむかむかする、すっぱいものが上がってくる、げっぷが出る、食欲不振、吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（茶褐色～黒褐色）、黒い便が出る

重大な副作用	主な自覚症状
胃腸出血 いちょうしゅっけつ	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝炎 かんえん	体がだるい、吐き気、嘔吐、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる
失神 しっしん	短時間、意識を失い倒れる
幻覚 げんかく	実際には存在しないものを存在するかのようを感じる
激越 げきえつ	感情が激しくたかぶった状態、落ち着きがない
せん妄 せんもう	軽度の意識混濁、興奮状態、幻覚、妄想
錯乱 さくらん	注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない
脱水 だっすい	喉が渇く、体重が減る、立ちくらみ、めまい、疲れやすい、体に力が入らない、手足がつる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、顔や手足の筋肉がぴくつく、食欲不振、体がだるい、発熱、体がかゆくなる、体重が減る、疲れやすい、体に力が入らない
頭部	めまい、突然のめまい、意識の低下、突然の意識の低下、突然の意識の消失、気を失う、立ちくらみ、一時的にボーっとする、短時間、意識を失い倒れる、実際には存在しないものを存在するかのようを感じる、突然の頭痛、感情が激しくたかぶった状態、落ち着きがない、軽度の意識混濁、興奮状態、妄想、注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない、幻覚
顔面	あごの痛み
眼	白目が黄色くなる
口や喉	もどす、嘔吐、吐き気、吐いた物に血が混じる（鮮紅色または赤色～茶褐色または黒褐色、茶褐色～黒褐色）、げっぷが出る、喉が渇く、血を吐く、突然の嘔吐、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる
胸部	胸を強く押さえつけられた感じ、しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、息切れ、胸やけ、すっぱいものが上がってくる、動悸
腹部	腹痛、上腹部不快感、胃がむかむかする、上腹部痛
手・足	突然片側の手足が動かしくくなる、左腕の痛み、脈が遅くなる、脈がとぶ、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、手足がつる

部位	自覚症状
皮膚	皮膚が黄色くなる
便	黒い便が出る、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

販売名	リバルエン LA パッチ 25.92mg	リバルエン LA パッチ 51.84mg
包装袋	表  裏 	表  裏 
形状		
	無色～淡黄色であり、透明～やや不透明な膏体層を半透明な支持体に展延したテープ剤	
大きさ	3.7cm×3.1cm 面積：10.80cm ²	5.1cm×4.3cm 面積：21.60cm ²

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	リバスチグミン
添加剤	トコフェロール、アクリル酸2-エチルエステル・酢酸ビニル共重合体溶液、メタクリル酸ブチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリイソブチレンヘプタン溶液、ポリブテン、ポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
- ・使用するまで包装袋を開けてはいけません。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

●廃棄方法は？

- ・はがしたパッチは、まだ薬の成分が残っているので接着面を内側にして半分に折り込んでください。必ず、子供の手や目の届かないところに廃棄してください。
- ・パッチをはがした後は、石けんを使って手を洗ってください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社 (<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

くすり相談

電話番号：０１２０－７５７－１０８

受付時間：９時～１７時３０分

（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）