

バルサルタン OD 錠 20mg 「トーワ」
 バルサルタン OD 錠 40mg 「トーワ」
 バルサルタン OD 錠 80mg 「トーワ」
 バルサルタン OD 錠 160mg 「トーワ」

【この薬は？】

販売名	バルサルタン OD 錠 20mg 「トーワ」 VALSARTAN OD TABLETS 20 mg “ TOWA ”	バルサルタン OD 錠 40mg 「トーワ」 VALSARTAN OD TABLETS 40 mg “ TOWA ”	バルサルタン OD 錠 80mg 「トーワ」 VALSARTAN OD TABLETS 80 mg “ TOWA ”	バルサルタン OD 錠 160mg 「トーワ」 VALSARTAN OD TABLETS 160 mg “ TOWA ”
一般名	バルサルタン Valsartan			
含有量 (1 錠中)	20mg	40mg	80mg	160mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アンジオテンシン 受容体拮抗薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、血管を収縮する作用のあるアンジオテンシン と呼ばれる物質の働きを抑えることで血圧を下げます。

- ・次の病気の人に処方されます。

高血圧症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にバルサルタンOD錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
 - ・アリスキレンを使用している糖尿病の人（ただし、他の血圧を下げる治療を並行して行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の人を除く）
- 次の人は、慎重に使う必要があります。飲み始める前に医師または薬剤師に告げてください。
 - ・腎動脈狭窄のある人
 - ・高カリウム血症の人
 - ・腎臓に重篤な障害がある人
 - ・肝臓に障害がある人
 - ・脳血管に障害がある人
 - ・高齢の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

[成人の場合]

一回量	40～80mg
飲む回数	1日1回

- ・1回40～80mgを服用しても効果が不十分な場合には1回160mgまで増量されることがあります。

[6歳以上の小児の場合]

	体重35kg未満	体重35kg以上
一回量	20mg	40mg
飲む回数	1日1回	

- ・体重35kg未満の小児の場合、1回20mgを服用しても効果が不十分な場合には1回40mgまで増量されることがあります。
- ・体重35kg以上の小児の場合、1回40mgを服用しても効果が不十分な場合には増量されることがあります。

● **どのように飲むか？**

この薬は、口の中で溶かして飲む薬です。舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。唾液だけでは飲み込めない場合はコップ1杯の水またはぬるま湯で飲み込んでください。

● **飲み忘れた場合の対応**

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

● **多く使用した時（過量使用時）の対応**

著しい血圧低下（からだがだるい、ふらつき、力が入らない、めまい、頭が重い、頭の痛み）、意識レベルの低下（ぼーっとする、考えがまとまらない、判断力の低下）、循環虚脱（冷や汗、意識がなくなる、顔面蒼白、息苦しい）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。

【**この薬の使用中に気をつけなければならないことは？**】

- ・この薬は腎臓に障害がある人やコントロール不良の糖尿病の人に、高カリウム血症をおこすおそれがあるので、これらの人では血液検査がおこなわれることがあります。
- ・急激な血圧の低下（失神、意識消失など）があらわれることがあるので、そのような場合には、医師に連絡してください。特に、透析中の人、利尿降圧剤を使っている人や厳重な減塩療法中の人では十分注意してください。
- ・肝炎などの重篤な肝障害があらわれたとの報告があるので、吐き気、嘔吐、体がだるいなどの症状があらわれた場合には、速やかに医師に相談してください。
- ・手術前24時間はこの薬を使用しないことが望ましいので、手術を受ける場合、必ずこの薬を飲んでいないことを医師に伝え、医師の指示に従ってください。
- ・血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使うことができません。
- ・この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに医師に相談してください。
- ・妊娠する可能性がある人は、医師や薬剤師に、この薬が妊婦や胎児に影響を及ぼす可能性があることについて説明を受け、十分に理解してください。
特に、妊娠の希望や予定のある人は、医師に相談してください。
- ・授乳中の人、授乳を中止してください。

薬の影響を心配する女性に対し、妊娠と薬情報センターで相談に応じています。さらに詳しい説明を希望される場合には妊娠と薬情報センターにご相談ください。

妊娠と薬情報センター

（国立成育医療研究センター）電話：03-5494-7845

- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいないことを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
血管浮腫 けっかんふしゅ	まぶた・唇・舌のはれ、息苦しい、じんましん
肝炎 かんえん	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、皮膚が黄色くなる
腎不全 じんふぜん	むくみ、全身のけいれん、貧血、頭痛、のどが渇く、吐き気、食欲不振、尿量が減る、無尿、血圧上昇
高カリウム血症 こうカリウムけっしょう	唇がしびれる、手足が動きづらい、手足に力が入らない、手足のしびれ・まひ、筋肉が衰える、筋力の減退
ショック ショック	冷や汗、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、血の気が引く、息切れ、判断力の低下
失神 しっしん	気を失う
意識消失 いしきしょうしつ	意識がなくなる、考えがまとまらない、気を失う
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
白血球減少 はっけっきゅうげんしょう	発熱、のどの痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	から咳、息苦しい、息切れ、発熱
低血糖 ていけっとう	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、頭痛、動悸、空腹感、手足のふるえ
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
中毒性表皮壊死融解症（TEN） ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう（テン）	からだがだるい、関節の痛み、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、発熱、食欲不振
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん（スティーブンス・ジョンソンしょうこうぐん）	からだがだるい、高熱、発熱、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、陰部の痛み
多形紅斑 たけいこうはん	関節の痛み、発熱、発疹や水ぶくれができる

重大な副作用	主な自覚症状
天疱瘡 てんぼうそう	全身の激しいかゆみ、全身の皮膚や粘膜に生ずる大小の水ぶくれ（水疱）、破れやすい水ぶくれ（水疱）
類天疱瘡 るいてんぼうそう	かゆみの激しい水疱

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、むくみ、全身のけいれん、貧血、冷や汗、発熱、ふらつき、脱力感、関節の痛み、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、高熱、全身の激しいかゆみ
頭部	頭痛、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識がなくなる
顔面	血の気が引く、鼻血
眼	まぶたのはれ、白目が黄色くなる、まぶたや眼の充血、結膜のただれ
口や喉	唇のはれ、舌のはれ、吐き気、嘔吐（おうと）、のどが渇く、唇がしびれる、のどの痛み、歯ぐきの出血、から咳、ひどい口内炎、唇や口内のただれ
胸部	息苦しい、吐き気、息切れ、動悸
腹部	吐き気、食欲不振、空腹感
手・足	手足が動きづらい、手足に力が入らない、手足のしびれ・まひ、手足のふるえ、手足のこわばり、関節の痛み
皮膚	じんましん、皮膚が黄色くなる、むくみ、あおあざができる、皮下出血、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、全身の皮膚や粘膜に生ずる大小の水ぶくれ（水疱）、かゆみの激しい水疱
筋肉	筋肉が衰える、筋力の減退、筋肉の痛み
尿	尿量が減る、無尿、尿が赤褐色になる
その他	血圧上昇、判断力の低下、気を失う、出血が止まりにくい、陰部の痛み

【この薬の形は？】

販売名		バルサルタン OD 錠 20mg 「トーワ」	バルサルタン OD 錠 40mg 「トーワ」
PTP シート	表		
	裏		
形状		口腔内崩壊錠 (割線入り) 	口腔内崩壊錠 (割線入り) 
錠径		6.5mm	8.5mm
厚さ		3.5mm	4.1mm
重さ		113mg	225mg
色		白色	白色
本体 表示	表	バルサ 20	バルサ 40
	裏	バルサルタン OD20 トーワ	バルサルタン OD40 トーワ

販売名		バルサルタン OD 錠 80mg 「トーワ」	バルサルタン OD 錠 160mg 「トーワ」
PTP シート		表  裏 	表  裏 
形状		口腔内崩壊錠 (割線入り) 	口腔内崩壊錠 (割線入り) 
錠径		11.0mm	14.0mm
厚さ		4.9mm	6.2mm
重さ		450mg	900mg
色		白色	白色
本体表示	表	バルサ 80	バルサ 160
	裏	バルサルタン OD80 トーワ	バルサルタン OD160 トーワ

【この薬に含まれているのは？】

販売名	バルサルタン OD 錠 20mg 「トーワ」	バルサルタン OD 錠 40mg 「トーワ」	バルサルタン OD 錠 80mg 「トーワ」	バルサルタン OD 錠 160mg 「トーワ」
有効成分	バルサルタン			
添加物	D-マンニトール、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸、酸化チタン、クロスカルメロースナトリウム、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、タルク、l-メントール、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、香料、その他3成分			

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社 (<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

くすり相談

電話番号：0120-757-108

受付時間：９時～１７時３０分

（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）