

タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」
 タクロリムス錠 1mg 「トーワ」
 タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」
 タクロリムス錠 2mg 「トーワ」
 タクロリムス錠 3mg 「トーワ」

【この薬は？】

販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」 TACROLIMUS TABLETS 0.5mg “TOWA”	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」 TACROLIMUS TABLETS 1mg “TOWA”	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」 TACROLIMUS TABLETS 1.5mg “TOWA”	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」 TACROLIMUS TABLETS 2mg “TOWA”	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」 TACROLIMUS TABLETS 3mg “TOWA”
一般名	タクロリムス水和物 Tacrolimus Hydrate				
含有量 (1錠中)	0.51mg (タクロリムス として0.5mg)	1.02mg (タクロリムス として1mg)	1.53mg (タクロリムス として1.5mg)	2.04mg (タクロリムス として2mg)	3.06mg (タクロリムス として3mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、免疫抑制剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、体内の免疫反応を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。
 1. 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制
腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植
 2. 骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制
 3. 重症筋無力症
 4. 関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）
 5. ループス腎炎（ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合）
 6. 難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等症～重症に限る）
 7. 多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎
- ・関節リウマチには、過去に非ステロイド性抗炎症剤や他の抗リウマチ薬などの既存療法で効果が不十分な場合に使用されます。
- ・潰瘍性大腸炎には、ステロイド治療で効果が不十分な場合や、ステロイド治療において、量を減らしたり中止したりすると症状が悪化するためステロイドによる治療を中止しにくい場合に使用されます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬は、重篤な副作用（腎不全、心不全、感染症、全身けいれん、意識障害、脳梗塞、血栓性微小血管障害、汎血球減少症など）があらわれることがあります。その際に適切な措置を行わないと死亡に至ることがあります。
- 関節リウマチの治療のためにこの薬を使用する場合、使用している間に重篤な副作用のあらわれる可能性や長期にわたり使用し続ける必要性について、患者さんは、十分理解できるまで説明を受けてください。また、この薬の使用中に何か異常があった場合には、ただちに使用を中止し医師に連絡してください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にタクロリムス錠「トーワ」に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・シクロスポリンまたはボセンタンを使用している人
 - ・カリウム保持性利尿剤を使用している人
 - ・生ワクチンを使用している人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・感染症にかかっている人
 - ・関節リウマチの人で間質性肺炎にかかっている人
 - ・肝炎ウイルスキャリアの人
 - ・腎臓に障害のある人
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬[生ワクチン（乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経口生ポリオワクチンなど）、シクロスポリン（サンディミュン、ネオーラル）、ボセンタン（トラクリア）、カリウム保持性利尿剤（スピロノラクトン（アルダクトンA）、カンレノ酸カリウム（ソルダクトン）、トリアムテレン（トリテレン）]や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 重症筋無力症で胸腺を摘出していない人は、この薬を使用する前と使用を開始してから定期的に胸腺腫があるかどうかの検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状やこの薬の血中濃度などにあわせて、医師が決めます。
決められた錠数を守って使用することが重要です。
通常、飲む量および回数は以下のとおりです。

〔腎移植の場合〕

時期	移植2日前より				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 3錠	体重 10kg あたり 1.5錠	体重 10kg あたり 1錠	体重 10kg あたり 0.75錠	体重 10kg あたり 0.5錠
飲む回数	1日2回				

時期	術後初期				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 3錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 1.5錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 1錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.75錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.5錠 以後、徐々に 減量する
飲む回数	1日2回				

時期	維持量				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 1.2錠 を標準とする	体重 10kg あたり 0.6錠 を標準とする	体重 10kg あたり 0.4錠 を標準とする	体重 10kg あたり 0.3錠 を標準とする	体重 10kg あたり 0.2錠 を標準とする
飲む回数	1日2回				

〔肝移植の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	体重 10kg あたり 3錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 1.5錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 1錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.75錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.5錠 以後、徐々に 減量する
飲む 回数	1日2回				

時期	維持量				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	1日量として 体重 10kg あたり 2錠 を標準とする	1日量として 体重 10kg あたり 1錠 を標準とする	1日量として 体重 10kg あたり 0.67錠 を標準とする	1日量として 体重 10kg あたり 0.5錠 を標準とする	1日量として 体重 10kg あたり 0.33錠 を標準とする
飲む 回数	医師が決めます				

〔心移植の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	体重 10kg あたり 0.6～3錠	体重 10kg あたり 0.3～1.5錠	体重 10kg あたり 0.2～1錠	体重 10kg あたり 0.15～0.75錠	体重 10kg あたり 0.1～0.5錠
飲む 回数	1日2回				

時期	拒絶反応発現後の投与				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 1.5～3 錠	体重 10kg あたり 0.75～1.5 錠	体重 10kg あたり 0.5～1 錠	体重 10kg あたり 0.375～0.75 錠	体重 10kg あたり 0.25～0.5 錠
飲む回数	1日2回				

時期	安定した状態が得られた後（維持量）				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	徐々に減量して有効最小量で維持する				
飲む回数	医師が決めます				

〔肺移植の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 1～3 錠	体重 10kg あたり 0.5～1.5 錠	体重 10kg あたり 0.33～1 錠	体重 10kg あたり 0.25～0.75 錠	体重 10kg あたり 0.17～0.5 錠
飲む回数	1日2回				

時期	安定した状態が得られた後（維持量）				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	徐々に減量して有効最小量で維持する				
飲む回数	医師が決めます				

〔膵移植の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	体重 10kg あたり 3錠	体重 10kg あたり 1.5錠	体重 10kg あたり 1錠	体重 10kg あたり 0.75錠	体重 10kg あたり 0.5錠
飲む回数	1日2回				

時期	維持量				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	徐々に減量して有効最小量で維持する				
飲む回数	医師が決めます				

〔小腸移植の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	体重 10kg あたり 3錠	体重 10kg あたり 1.5錠	体重 10kg あたり 1錠	体重 10kg あたり 0.75錠	体重 10kg あたり 0.5錠
飲む回数	1日2回				

時期	維持量				
販売名	タクロリムス 錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス 錠 3mg 「トーワ」
1回量	徐々に減量して有効最小量で維持する				
飲む回数	医師が決めます				

〔骨髄移植の場合〕

時期	移植1日前				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 1.2錠	体重 10kg あたり 0.6錠	体重 10kg あたり 0.4錠	体重 10kg あたり 0.3錠	体重 10kg あたり 0.2錠
飲む回数	1日2回				

時期	移植初期				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 1.2錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.6錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.4錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.3錠 以後、徐々に 減量する	体重 10kg あたり 0.2錠 以後、徐々に 減量する
飲む回数	1日2回				

時期	移植片対宿主病発現後の投与				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	体重 10kg あたり 3錠	体重 10kg あたり 1.5錠	体重 10kg あたり 1錠	体重 10kg あたり 0.75錠	体重 10kg あたり 0.5錠
飲む回数	1日2回				

臓器移植や骨髄移植では、この薬を多く飲んだときの副作用、および飲む量が少なすぎたときの拒絶反応などを防ぐために、血中濃度を測定して飲む量を調節します。特に飲み始めは頻回に血中濃度を測定します。医師が指示した受診日を守ってください。

〔重症筋無力症の場合〕

販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1mg 「トーフ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーフ」	タクロリムス錠 2mg 「トーフ」	タクロリムス錠 3mg 「トーフ」
1回量	6錠	3錠	2錠	1.5錠	1錠
飲む回数	1日1回夕食後				

〔ループス腎炎の場合〕

販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
1回量	6錠	3錠	2錠	1.5錠	1錠
飲む回数	1日1回夕食後				

- ・重症筋無力症とループス腎炎では、副作用がおこるのを防ぐために、始めの3ヵ月は1ヵ月に1回を目安に、以後は定期的に血中濃度を測定し、飲む量を調節します。医師が指示した受診日を守ってください。
- ・ループス腎炎では、2ヵ月使用しても効果が得られない場合には使用を中止されることがあります。

〔関節リウマチの場合〕

販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」		タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	
1回量	成人	高齢者	成人	高齢者
	6錠	3錠から開始し、 症状により6錠 まで増量できる	3錠	1.5錠から開始し、 症状により3錠 まで増量できる
飲む回数	1日1回夕食後			

販売名	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」		タクロリムス錠 2mg 「トーワ」		タクロリムス錠 3mg 「トーワ」	
1回量	成人	高齢者	成人	高齢者	成人	高齢者
	2錠	1錠から開始し、 症状により2錠 まで増量 できる	1.5錠	0.75錠か ら開始し、 症状により 1.5錠まで 増量できる	1錠	0.5錠から 開始し、症 状により1 錠まで増 量できる
飲む回数	1日1回夕食後					

関節リウマチでは、飲む量を増やす場合には、副作用がおこるのを防ぐために、血中濃度を測定し、飲む量を調節します。医師の指示した受診日を守ってください。

〔潰瘍性大腸炎の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
1回量	体重 10kg あたり 0.5 錠	体重 10kg あたり 0.25 錠	体重 10kg あたり 0.17 錠	体重 10kg あたり 0.125 錠	体重 10kg あたり 0.08 錠
飲む回数	1日2回朝夕食後				

時期	使用開始後2週間				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
1回量	血中濃度にしたがって医師が決めます				
飲む回数	医師が決めます				

時期	使用開始後2週間以降				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
1回量	血中濃度にしたがって医師が決めます				
飲む回数	医師が決めます				

- ・使用開始後2週間までと使用開始後2週間以降では目標とする血中濃度が違います。
- ・1日の投与量は原則、体重10kgあたり3mgまでです。
- ・治療初期は頻回に血中濃度を測定し飲む量を調節します。医師の指示した受診日を守ってください。
- ・2週間使用しても効果が得られない場合には、使用を中止されることがあります。
- ・通常、3ヵ月までの使用となります。

〔多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎の場合〕

時期	初期				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
1 回量	体重 10kg あたり 0.75 錠	体重 10kg あたり 0.375 錠	体重 10kg あたり 0.25 錠	体重 10kg あたり 0.1875 錠	体重 10kg あたり 0.125 錠
飲む回数	1 日 2 回朝夕食後				

時期	使用開始後				
販売名	タクロリムス錠 0.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1mg 「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg 「トーワ」	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
1 回量	血中濃度にしたがって医師が決めます				
飲む回数	医師が決めます				

- ・ 1 日に体重10kgあたり 3mgを超えて使用することはありません。
- ・ 飲み始めは原則としてステロイド剤が併用されます。症状が安定した後にはステロイド剤は徐々に減量されることがあります。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

〔1 日 2 回飲む場合〕

気がついた時にできるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間は、5 時間以上間隔をあけてください。

〔1 日 1 回飲む場合〕

その日のうちに気がついた時はできるだけ早く飲んでください。翌日気がついた時は忘れた分を飲まないで、次の決められた飲む時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

尿素窒素上昇やクレアチニン上昇（腎機能検査値の異常）、肝酵素上昇（肝機能検査値の異常）、吐き気や手がふるえるなどの症状があらわれる可能性がありますので、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・腎障害や高カリウム血症がおこりやすいので、頻回に血液検査が行われます。
- ・膵障害がおこりやすいので、頻回に空腹時血糖測定などの検査が行われます。
- ・この薬の使用中に、心不全、不整脈、心筋梗塞、狭心症、心筋障害がおこることがあるので、心電図、心エコー、胸部X線検査が行われます。
- ・高血圧がおこることがあるので、定期的に血圧測定が行われます。また、血圧が上昇したときは降圧剤を飲むなどの治療が行われます。
- ・この薬により、体の抵抗力が弱まり、かぜなどの感染症にかかりやすくなることがあります。人混みを避けたり、外出後は手洗いやうがいなどをしたり、感染症にかからないように気をつけてください。
- ・重症筋無力症で胸腺を摘出していない人は、定期的に胸腺腫があるかどうかの検査が行われます。検査により胸腺腫が確認された場合は胸腺を摘出するなどの治療が行われます。
- ・潰瘍性大腸炎では、この薬を2週間使用しても効果が得られない場合は、使用が中止されます。また、通常3ヵ月までの使用となります。
- ・B型肝炎またはC型肝炎ウイルスキャリアといわれている人は、定期的な血液検査が行われます。B型肝炎ウイルスの再活性化またはC型肝炎の悪化が起こっていると思える症状(発熱、倦怠感(けんたいかん)、皮膚や白眼が黄色くなる、食欲不振など)があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・グレープフルーツジュースによって、作用が強くあらわれることがあります。
- ・セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort, セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
ネフローゼ症候群 ネフローゼしょうこうぐん	尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、息苦しい、尿が赤みを帯びる、むくみ、体がだるい、体重の増加
心不全 しんふぜん	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加
不整脈 ふせいみやく	めまい、動悸(どうき)、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ

重大な副作用	主な自覚症状
心筋梗塞 しんきんこうそく	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷汗が出る
狭心症 きょうしんしょう	しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、冷汗が出る、あごの痛み、左腕の痛み
心膜液貯留 しんまくえきちよりゅう	体がだるい、息苦しい、息切れ、むくみ、血圧低下
心筋障害 しんきんしょうがい	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加
中枢神経系障害 ちゅうすうしんけいけいしょうがい	頭の痛み、しゃべりにくい、手足のふるえ、集中力の低下、物事が思い出せない・覚えられない
脳血管障害 のうけっかんしょうがい	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしにくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐(おうと)、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる
血栓性微小血管障害 けっせんせいびしょうけっかんしょうがい	血が出やすくなる、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、血尿
汎血球減少症 はんけっきゅうげんしょうしょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
血小板減少性紫斑病 けっしょうばんげんしょうせいしはんびょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
溶血性貧血 ようけっせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
赤芽球癆 せきがきゅうろう	体がだるい、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ
イレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐、お腹が張る、腹痛
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンスジョンソン症候群) ひふねんまくがんしょうこうぐん (スティーブンスジョンソンしょうこうぐん)	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
呼吸困難 こきゅうこんなん	息苦しい、息切れ
急性呼吸窮迫症候群 きゅうせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん	息苦しい、咳、痰、呼吸がはやくなる、脈が速くなる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる
感染症 かんせんしょう	発熱、寒気、体がだるい

重大な副作用	主な自覚症状
進行性多巣性白質脳症(PML) しんこうせいたそうせいはいく しつとうしょう(ピーエムエル)	けいれん、意識の低下、意識の消失、しゃべりにくい、物忘れをする、手足のまひ
BK ウイルス腎症 ビー・ケー・ウイルスじんしょう	体がだるい、頭痛、発熱、むくみ、下腹部の痛み、尿の回数が増える、尿が残っている感じがする、血尿、尿量が減る
リンパ腫等の悪性腫瘍 リンパしゅなどのあくせいしゅよう	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ、悪性の腫瘍
膵炎 すいえん	強い腹痛、背中痛み、お腹が張る、吐き気、嘔吐、体重が減る、喉が渇く、尿量が増える、皮膚が黄色くなる、油っぽい下痢が出る
糖尿病及び糖尿病の悪化 とうにようびょうおよびとう にようびょうのあつか	体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増える
高血糖 こうけつとう	体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増える
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
クリーゼ	下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、唾液の量が増加、発汗、呼吸困難、脈が遅くなる、縮瞳(瞳孔が小さくなる)、意識の低下
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	むくみ、体がだるい、体重の増加、疲れやすい、冷汗が出る、血が出やすくなる、出血しやすい、発熱、寒気、出血が止まりにくい、突然の高熱、けいれん、リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ、悪性の腫瘍、体重が減る、力が入らない、体がかゆくなる、発汗
頭部	めまい、気を失う、頭の痛み、集中力の低下、物事が思い出せない・覚えられない、突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然の頭痛、突然のめまい、頭痛、意識の低下、意識の消失、物忘れをする
顔面	あごの痛み、鼻血

部位	自覚症状
眼	白目が黄色くなる、目の充血やただれ、縮瞳(瞳孔が小さくなる)
耳	耳鳴り
口や喉	しゃべりにくい、突然の嘔吐、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる、歯ぐきの出血、喉の痛み、吐き気、嘔吐、唇や口内のただれ、咳、痰、唇が青紫色になる、喉が渇く、水を多く飲む、唾液の量が増加
胸部	息苦しい、息切れ、動悸、しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、呼吸がはやくなる、呼吸困難
腹部	お腹が張る、腹痛、下腹部の痛み、強い腹痛、食欲不振
背中	背中での痛み
手・足	脈が遅くなる、脈がとぶ、左腕の痛み、手足のふるえ、突然片側の手足が動かしくくなる、脈が速くなる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、手足のまひ
皮膚	あおあざができる、皮膚が黄色くなる、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
便	便やおならが出にくい、油っぽい下痢が出る、下痢
尿	尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、尿が赤みを帯びる、血尿、尿の色が濃くなる、尿の回数が増える、尿が残っている感じがする、尿量が増える
その他	血圧低下

【この薬の形は？】

販売名	タクロリムス錠 0.5mg「トーワ」	タクロリムス錠 1mg「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg「トーワ」
PTP シート	表 	表 	表 
	裏 	裏 	裏 
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 
直径	5.6mm	6.1mm	6.6mm
厚さ	2.8mm	3.0mm	3.0mm
重さ	78mg	100mg	116mg
色	白色	白色	淡黄色
本体表示	表 タクロリムス 0.5 トーワ	表 タクロリムス 1 トーワ	表 タクロリムス 1.5 トーワ

販売名	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」	タクロリムス錠 3mg 「トーワ」
PTP シート	<p>表</p>  <p>裏</p> 	<p>表</p>  <p>裏</p> 
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠(割線入り) 
直径	8.1mm	8.1mm
厚さ	3.6mm	3.4mm
重さ	199mg	190mg
色	ごくうすい赤色	淡黄色
本体 表示	表	タクロ 3
	裏	タクロリムス 3 トーワ

【この薬に含まれているのは？】

販売名	タクロリムス錠 0.5mg「トーワ」	タクロリムス錠 1mg「トーワ」	タクロリムス錠 1.5mg「トーワ」
有効成分	タクロリムス水和物		
添加剤	乳糖水和物、ヒプロメロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン	乳糖水和物、ヒプロメロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄	

販売名	タクロリムス錠 2mg「トーワ」	タクロリムス錠 3mg「トーワ」
有効成分	タクロリムス水和物	
添加剤	乳糖水和物、ヒプロメロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、酸化チタン、マクロゴール6000、タルク、三二酸化鉄	乳糖水和物、ヒプロメロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社 (<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

くすり相談

電話番号：0120-757-108

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）