

トラニラストカプセル 100mg 「トローワ」

【この薬は？】

販売名	トラニラストカプセル 100mg 「トローワ」 TRANILAST CAPSULES 100mg “TOWA”
一般名	トラニラスト Tranilast
含有量 (1カプセル中)	100mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アレルギー性疾患治療剤、ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤に属する薬です。
- ・この薬は、白血球等からの炎症を誘発する物質（ケミカルメディエーターやサイトカイン）の作用を抑え、炎症を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

気管支喘息，アレルギー性鼻炎，アトピー性皮膚炎，ケロイド・肥厚性瘢痕

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・妊婦（特に妊娠3ヵ月以内）または妊娠している可能性がある人
 - ・過去にトラニラストカプセルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・肝臓に障害のある人、または過去に肝臓に障害があった人
 - ・腎臓に障害のある人、または過去に腎臓に障害があった人
 - ・高齢の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

対象	成人
一回量	1カプセル
飲む回数	1日3回

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、その回の使用を避けて、次の使用時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用中は、定期的に血液検査が行われることがあります。
- ・この薬は、すでに起こっている発作や症状を速やかに軽減する薬剤ではありません。正しい使用方法について、患者さんまたは家族の方は、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
膀胱炎様症状 ぼうこうえんようしょうじょう	排尿時の痛み、尿が近い、尿意が残る
肝機能障害 かんきのうしょうがい	吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、かゆみ、尿の色が濃くなる、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、からだのだるい
黄疸 おうだん	尿が褐色になる、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる
腎機能障害 じんきのうしょうがい	顔のむくみ、頭痛、尿量が減る、眼がはれぼったい
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	のどの痛み、発熱
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	歯ぐきの出血、あおあざができる、鼻血、出血が止まりにくい、皮下出血

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。

これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだのだるい、発熱
頭部	頭痛
顔面	顔のむくみ、鼻血
眼	白目が黄色くなる、眼がはれぼったい
口や喉	嘔吐（おうと）、吐き気、のどの痛み、歯ぐきの出血
胸部	吐き気
腹部	食欲不振、吐き気
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ、あおあざができる、皮下出血
尿	排尿時の痛み、尿が近い、尿意が残る、尿の色が濃くなる、尿が褐色になる、尿量が減る
その他	出血が止まりにくい

【この薬の形は？】

形状	硬カプセル剤（3号） 	
全長	15.8mm	
重さ	219mg	
色	頭部：白色、胴部：白色	
識別コード	本体 包装	Tw. BRC

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	トラニラスト
添加物	内容物： 結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム、タルク カプセル本体： 酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、ゼラチン

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社(<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

くすり相談

電話番号：0120-757-108

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）