

患者向医薬品ガイド

2019年11月更新

レボフロキサシン内用液 250mg 「トーワ」

【この薬は?】

| | |
|--------------|--|
| 販売名 | レボフロキサシン内用液 250mg 「トーワ」 LEVOFLOXACIN ORAL SOLUTION 250mg "TOWA" |
| 一般名 | レボフロキサシン水和物 Levofloxacin Hydrate |
| 含有量 (1包中) | 250mg |

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は?】

- ・この薬は、ニューキノロン系抗菌薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・細菌のDNA（デオキシリボ核酸）の複製にかかる酵素を阻害することで、細菌の増殖をおさえ、殺菌作用を示します。
- ・次の病気の人処方されます。

＜適応症＞

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆囊炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中

耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兎病、肺結核及びその他の結核症、Q熱

<適応菌種>

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、結核菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシнетバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兎病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチャ（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ）

- ・この抗菌薬は自己判断で飲むのを止めたり、一回分を減らしたりしないでください。指示通りにきちんと飲まないと、治療効果が低下するばかりでなく、原因菌がこの薬の効かない菌に変化したり、他の抗菌薬も効かなくなったりする可能性があります。医師の指示通りに飲むことが大切です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にレボフロキサシン製剤に含まれる成分またはオフロキサシンで過敏症のあった人
- ・妊娠または妊娠している可能性がある人
- ・小児

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・腎臓に重い障害のある人
- ・てんかんなどのけいれん発作をおこすことがある人、または過去にてんかんなどのけいれん発作をおこしたことがある人
- ・過去にキノロン系抗菌薬で過敏症のあった人
- ・心臓に重篤な障害（不整脈、虚血性心疾患など）のある人
- ・重症筋無力症の人
- ・大動脈瘤や大動脈解離のある人、過去に大動脈瘤や大動脈解離のあった人、大動脈瘤や大動脈解離のあった人が血縁にいる人、大動脈瘤や大動脈解離の危険因子（マルファン症候群など）のある人
- ・高齢の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○大動脈瘤や大動脈解離のある人、過去に大動脈瘤や大動脈解離のあった人、大動

脈瘤や大動脈解離のあった人が血縁にいる人、大動脈瘤や大動脈解離の危険因子（マルファン症候群など）のある人は、画像検査が行われることがあります。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

- ・飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
- ・腎機能に障害のある人は飲む量が調節されます。
- ・通常、成人の使用する量および回数は次のとおりです。

「腸チフス」「パラチフス」以外の感染症

| | |
|------|------|
| 1回量 | 2包 |
| 飲む回数 | 1日1回 |

「腸チフス」「パラチフス」感染症

| | |
|------|-----------|
| 1回量 | 2包 |
| 飲む回数 | 1日1回 14日間 |

「肺結核及びその他の結核症」の治療では、原則として他の抗結核薬と併用されます。

●どのように飲むか？

- ・直接飲むか、コップ一杯くらいの水に混ぜて、すぐに飲んでください。ただし、茶葉抽出飲料（紅茶、烏龍茶、緑茶など）とは混ぜないでください。
- ・右図のように「押さえる」マークを持って開封口から開けてください。他の部分を持って開けると中身が飛び出ることがあります。
- ・切り口の角で口の中を傷つけないように注意してください。



●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合（次の飲む時間まで8時間未満）は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・他の抗結核薬と一緒に飲んでいる場合は、重篤な肝障害がおこることがあるので定期的に肝機能検査がおこなわれます。
- ・意識障害（気を失う、もうろう状態）などがあらわれることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作をおこなう場合には、十分に注意してください。

ださい。

- ・大動脈瘤、大動脈解離があらわれることがあるので、腹部、胸部、背部に痛みなどの症状があらわれた場合は、ただちに受診してください。これにより画像検査が行われることがあります。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれるることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|---|---|
| ショック ショック | 冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失 |
| アナフィラキシー アナフィラキシー | 全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい |
| 中毒性表皮壊死融解症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゅうかいしょう（テン） | 皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ |
| 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ひふねんまくがんしようこうぐん (スティーブンス・ジョンソンしようこうぐん) | 発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する |
| 痙攣 けいれん | 顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーッとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える |
| QT 延長 キューティーえんちょう | めまい、動悸、気を失う |
| 心室頻拍（トルサードド ポアントを含む） しんしつひんぱく（トルサードド ポアントをふくむ） | めまい、動悸、胸の不快感、気を失う |
| 急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい | 尿量が減る、むくみ、体がだるい |
| 間質性腎炎 かんしつせいじんえん | 発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐（おうと）、下痢、腹痛、むくみ、尿量が減る |
| 劇症肝炎 げきしょうかんえん | 急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色） |

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|--|---|
| 肝機能障害 かんきのうしょうがい | 疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振 |
| 黄疸 おうだん | 白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる |
| 無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう | 突然の高熱、寒気、喉の痛み |
| 汎血球減少症 はんけつきゅうげんしょうじょう | めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み |
| 血小板減少 けっしょうばんげんじょう | 鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい |
| 溶血性貧血 ようけつせいひんけつ | 体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる |
| 間質性肺炎 かんしつせいかいえん | 咳、息切れ、息苦しい、発熱 |
| 好酸球性肺炎 こうさんきゅうせいかいえん | 発熱、咳、息切れ、息苦しい |
| 偽膜性大腸炎等の血便 を伴う重篤な大腸炎 ぎまくせいだいちょうえんなどの けつべんをともなうじゅうとくな だいちょうえん | 腹痛、血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、発熱、頭痛、吐き気、冷汗が出る、顔面蒼白、手足が冷たくなる、お腹が張る、水のような便が出る、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色）、激しい腹痛、嘔吐、下痢 |
| 横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいじょう | 手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる |
| 低血糖 ていけつとう | お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下 |
| アキレス腱炎、腱断裂 等の腱障害 アキレスけんえん、けんだんれつ などのけんじょうがい | アキレス腱の痛み・はれ、歩行障害、注射した指の関節を曲げにくい、注射した指の関節を伸ばしにくい、注射した指の関節が曲がらない |
| 錯乱、せん妄、抑うつ 等の精神症状 さくらん、せんもう、よくうつな どのせいしんじょうじょう | 注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない、軽度の意識混濁、興奮状態、幻覚、妄想、気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、食欲不振、体がだるい |
| 過敏性血管炎 かびんせいけつかんえん | 皮下出血によるあざ、じんま疹 |
| 重症筋無力症の悪化 じゅうしょくきんむりょくじょう のあつか | まぶたが重い、まぶたが下がる、物がだぶって見える、筋肉の疲労感、食べ物が飲み込みにくい |
| 大動脈瘤 だいどうみやくりゅう | 声がれ、食べ物や水が上手く飲み込めずむせる、息苦しい、食べ物が飲み込みにくい、胸の痛み、背中の痛み、腹痛 |
| 大動脈解離 だいどうみやくかいり | 激しい腹痛、激しい胸の痛み、激しい背中の痛み |

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|--------------------------|---|
| 末梢神経障害 まっしょうしんけいしょうがい | 手足のしびれ、手足の痛み、手足の感覚がなくなる、手足の力が入らない、物がつかみづらい、歩行時につまずく |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位 | 自覚症状 |
|-----|---|
| 全身 | 冷汗が出る、発熱、ふらつき、出血が止まりにくい、突然の高熱、寒気、出血しやすい、体がだるい、疲れやすい、けいれん、顔や手足の筋肉がぴくつく、脱力感、むくみ、体がかゆくなる、力が入らない、急激に体重が増える |
| 頭部 | めまい、意識の消失、気を失う、頭痛、意識の低下、気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、一時的にボーッとする、注意力が散漫になる、問い合わせに間違った答えをする、行動にまとまりがない、軽度の意識混濁、興奮状態、妄想、急な意識の低下 |
| 顔面 | 顔面蒼白、鼻血、血の気が引く |
| 眼 | 目の充血やただれ、白目が黄色くなる、まぶたが重い、まぶたが下がる、物がだぶって見える、幻覚、物がつかみづらい |
| 耳 | 耳鳴り |
| 口や喉 | 咳、唇や口内のただれ、喉のかゆみ、歯ぐきの出血、喉の痛み、食べ物が飲み込みにくい、吐き気、嘔吐、血を吐く、声がれ、食べ物や水が上手く飲み込めずむせる |
| 胸部 | 動悸、胸の不快感、息切れ、息苦しい、胸の痛み、激しい胸の痛み |
| 腹部 | お腹が張る、腹痛、お腹がすく、食欲不振、激しい腹痛 |
| 背中 | 背中の痛み、激しい背中の痛み |
| 手・足 | 手足が冷たくなる、手足のふるえ、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、アキレス腱の痛み・はれ、歩行障害、注射した指の関節を曲げにくい、注射した指の関節を伸ばしにくい、注射した指の関節が曲がらない、手足のこわばり、手足のしびれ、関節の痛み、手足の痛み、手足の感覚がなくなる、手足の力が入らない、歩行時につまずく |
| 皮膚 | 円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発する、粘膜のただれ、全身のかゆみ、じんま疹、皮下出血によるあざ、あおあざができる、皮膚が黄色くなる、発疹 |
| 筋肉 | 筋肉の痛み、筋肉の疲労感 |
| 便 | 血の混ざったゆるい便が出る、水のような便が出る、ゆるい便が出る、下痢、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色） |
| 尿 | 尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる、尿量が減る |

【この薬の形は？】

| | |
|----|--|
| 形状 |  |
| 性状 | 黄色澄明の液  |

【この薬に含まれているのは？】

| | |
|------|--|
| 有効成分 | レボフロキサシン水和物 |
| 添加物 | 粉末還元麦芽糖水アメ、スクラロース、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、安息香酸ナトリウム、乳酸、1-メントール、ベンジルアルコール、香料 |

【その他】

●この薬の保管方法は？

- 直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- 絶対に他の人に渡してはいけません。
- 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社 (<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

くすり相談

電話番号：0120-757-108

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）