

ガランタミン OD 錠 4 mg 「ニプロ」
ガランタミン OD 錠 8 mg 「ニプロ」
ガランタミン OD 錠 12mg 「ニプロ」

【この薬は？】

販売名	ガランタミン OD 錠 4 mg 「ニプロ」 Galantamine OD Tablets	ガランタミン OD 錠 8 mg 「ニプロ」 Galantamine OD Tablets	ガランタミン OD 錠 12mg 「ニプロ」 Galantamine OD Tablets
一般名	ガランタミン臭化水素酸塩 Galantamine Hydrobromide		
含有量 (1 錠中)	5. 126mg (ガランタミンとして 4 mg)	10. 253mg (ガランタミンとして 8 mg)	15. 379mg (ガランタミンとして 12mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アルツハイマー型認知症治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、アセチルコリン（脳内の神経伝達物質）を分解する酵素の働きを抑えてその減少を防いだり、アセチルコリンの作用を増強したりして、認知症症状の進行を遅らせます。
- ・次の目的で処方されます。

軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重

要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にガラントミン OD 錠「ニプロ」に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・心臓に障害（心筋梗塞、弁膜症、心筋症など）のある人、電解質異常（低カリウム血症など）のある人
- ・洞不全症候群または伝導障害などの心臓に障害のある人
- ・過去に消化性潰瘍があった人、消化管閉塞のある人、消化管手術直後の人
- ・下部尿路閉塞のある人、膀胱手術直後の人
- ・てんかんなどのけいれんをおこす疾患にかかっている人、または過去におこしたことがある人
- ・過去に気管支喘息や閉塞性肺疾患があった人
- ・錐体外路障害（パーキンソン病、パーキンソン症候群など）のある人
- ・腎臓に障害のある人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔通常〕

	飲み始めから 4 週間	4 週間後～
1 日量	8 mg	16mg
飲む回数	1 日 2 回食後	
最高量	1 日量として 24mg	

- ・増量が必要な場合、4 週間以上同じ用量を飲んだ後、増量されます。

〔肝臓に障害がある場合〕

	飲み始めから 1 週間以上	1 週間後～
1 日量	4 mg	8 mg
飲む回数	1 日 1 回食後	1 日 2 回食後
最高量	1 日量として16mg	

・増量が必要な場合、4 週間以上同じ用量を飲んだ後、増量されます。

●どのように飲むか？

舌の上にのせ唾液で湿らせて舌で軽くつぶし、水なしで飲むことができます。

また、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。

寝たままの状態では、水なしで飲まないようにしてください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

筋力低下、筋肉のけいれん、重度の吐き気、嘔吐（おうと）、消化管けいれん、よだれがでる、涙が止まりにくい、排尿、排便、発汗、徐脈、低血圧、虚脱（冷汗が出る、顔面蒼白（そうはく）、脱力感、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失、めまい）、けいれんなどがあらわれる可能性があります。これらの症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・アルツハイマー型認知症では運転能力や機械操作能力が徐々に低下し、また、この薬の使用により、めまい、眠気がおこることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。特に、使用し始めから数週間は注意してください。
- ・この薬の使用により、体重が減少することがあります。また、アルツハイマー型認知症でも体重が減少することがあるので、体重が減った場合は、医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。



このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
失神 しっしん	短時間、意識を失い倒れる
徐脈 じょみやく	めまい、立ちくらみ、息切れ、脈がとぶ、脈が遅くなる、気を失う
心ブロック しんブロック	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
QT延長（心電図の異常） キューティーえんちょう（しんでんずのいじょう）	動悸（どうき）、めまい、気を失う
急性汎発性発疹性膿疱症 きゅうせいはんぱつせいほっしんせいのうほうしょう	発熱、皮膚が広い範囲で赤くなる、ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る
肝炎 かんえん	体がだるい、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手足のこわばり、手足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、発熱、脱力感、体がかゆくなる
頭部	短時間、意識を失い倒れる、めまい、立ちくらみ、気を失う
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気、嘔吐
胸部	息切れ、動悸
腹部	食欲不振、上腹部痛
手・足	脈がとぶ、脈が遅くなる、手足のしびれ、手足のこわばり
皮膚	皮膚が広い範囲で赤くなる、ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る、皮膚が黄色くなる
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる

【この薬の形は？】

販売名	ガランタミン OD 錠 4 mg 「ニプロ」	ガランタミン OD 錠 8 mg 「ニプロ」	ガランタミン OD 錠 12mg 「ニプロ」
PTP シート			
形状	素錠（口腔内崩壊錠） 	素錠（口腔内崩壊錠） 	素錠（口腔内崩壊錠） 
直径	7.1mm	7.1mm	8.1mm
厚さ	2.9mm	2.9mm	3.4mm
重さ	120mg	120mg	180mg
色	微黄色～淡黄色	微赤色～淡赤色	白色～微黄白色

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ガランタミン OD 錠 4 mg 「ニプロ」	ガランタミン OD 錠 8 mg 「ニプロ」	ガランタミン OD 錠 12mg 「ニプロ」
有効成分	ガランタミン臭化水素酸塩		
添加剤	D - マンニトール、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム（L - フェニルアラニン化合物）、香料、ステアリン酸マグネシウム		
	黄色三二酸化鉄	三二酸化鉄	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ニプロ株式会社 (<https://www.nipro.co.jp/>)

医薬品情報室

電話：0120-226-898

受付時間：9時～17時15分

（土、日、祝日、その他弊社休業日を除く）