

# 患者向医薬品ガイド

2022年10月更新

## ラベプラゾールNa錠 20mg 「日新」

### 【この薬は?】

販売名	ラベプラゾールNa錠 20mg 「日新」 Rabeprazole Na Tablets 20mg "NISSIN"
一般名	ラベプラゾールナトリウム Rabeprazole Sodium
含有量 (1錠中)	20mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は?】

- この薬は、プロトンポンプ阻害剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- この薬は胃の中で、酸分泌を抑えます。
- 次の目的で処方されます。

#### 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群

- この薬は、体調がよくなつたと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にラベプラゾールNa錠20mg「日新」に含まれる成分に対して過敏な反応を経験したことがある人

- ・アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩を使用している人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・過去に薬剤で過敏な反応を経験したことがある人

- ・肝臓に障害のある人

- ・高齢の人

○この薬には併用してはいけない薬 [アタザナビル硫酸塩（レイアタツ）、リルピビリン塩酸塩（エジュラント）] や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量、回数および期間は次のとおりです。

[胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群]

1回量	10mg または 20mg	
飲む回数	1日1回	
飲む期間	胃潰瘍、吻合部潰瘍	8週間まで
	十二指腸潰瘍	6週間まで

[逆流性食道炎]

通常	1回量	10mg または 20mg
	飲む回数	1日1回
	飲む期間	8週間まで
プロトンポンプ阻害剤による治療で効果不十分な場合	1回量	10mg または 20mg*
	飲む回数	1日2回
	飲む期間	さらに8週間

\* 重度の粘膜傷害を有する場合に限り、1回20mgを1日2回飲みます。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・この薬の使用中に血液検査が行われることがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳中の方は、授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は?

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷や汗、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、血の気が引く、息切れ、判断力の低下
アナフィラキシー	からだがだるい、ふらつき、意識の低下、考えがまとまらない、ほてり、眼と口唇のまわりのはれ、しゃがれ声、息苦しい、息切れ、動悸(どうき)、じんましん、判断力の低下
汎血球減少 はんけつきゅうげんしょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	からだがだるい、ふらつき、疲れやすい、立ちくらみ、めまい、頭が重い、白目が黄色くなる、動く時の動悸や息切れ、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
劇症肝炎 げきしょうかんえん	発熱、意識がなくなる、意識の低下、考えがまとまらない、頭痛、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐(おうと)、食欲不振、羽ばたくような手のふるえ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、判断力の低下
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	発熱、から咳、息苦しい、息切れ
中毒性表皮壊死融解症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゆう かいしよう(テン)	からだがだるい、関節の痛み、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ(水疱)、発熱、食欲不振

重大な副作用	主な自覚症状
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） ひふねんまくがんじょうこうぐん (スティーブンス・ジョンソンじょうこうぐん)	からだがだるい、高熱、発熱、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、陰部の痛み
多形紅斑 たけいこうはん	関節の痛み、発熱、発疹や水ぶくれができる
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい、意識の低下、頭痛、眼がはrebottai、息苦しい、尿がでない、尿量が減る
間質性腎炎 かんしつせいじんえん	関節の痛み、発熱、頭痛、膨れあがる感じ(腹部)、血尿
低ナトリウム血症 ていナトリウムけっしょう	けいれん、意識の低下、頭痛、吐き気、嘔吐、食欲不振
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる

同類薬（オメプラゾール）であらわれる、特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。この薬でもあらわれる可能性があります。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
視力障害 しりょくしょうがい	ものの形が見えにくい、視力の低下、物が見えない、物が見えにくい
錯乱状態 さくらんじょうたい	意識が乱れる、意識の混乱、考えがまとまらない

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷や汗、からだがだるい、ふらつき、発熱、疲れやすい、立ちくらみ、関節の痛み、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ(水疱)、高熱、からだのむくみ、けいれん、脱力感
頭部	めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識の低下、頭が重い、意識がなくなる、頭痛、意識が乱れる、意識の混乱
顔面	血の気が引く、ほてり、鼻血
眼	眼と口唇のまわりのはれ、白目が黄色くなる、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、眼がはrebottai、ものの形が見えにくい、視力の低下、物が見えない、物が見えにくい
耳	耳鳴り
口や喉	しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、歯ぐきの出血、のどの痛み、吐き気、嘔吐、から咳、ひどい口内炎、唇や口内のただれ

部位	自覚症状
胸部	息切れ、息苦しい、動悸、動く時の動悸や息切れ、吐き気
腹部	食欲不振、吐き気、膨れあがる感じ(腹部)
手・足	羽ばたくような手のふるえ、関節の痛み、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ
皮膚	じんましん、あおあざができる、皮下出血、皮膚が黄色くなる、かゆみ、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、発疹や水ぶくれができる
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿の色が濃くなる、尿が褐色になる、尿がでない、尿量が減る、血尿、尿が赤褐色になる
その他	判断力の低下、出血しやすい、出血が止まりにくい、陰部の痛み

## 【この薬の形は？】

PTP シート	
形状	腸溶フィルムコーティング錠 
直径	7.2mm
厚さ	3.8mm
重さ	142mg
色	淡黄色
本体表示	ラベプラゾール 20 NS

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ラベプラゾールナトリウム
添加物	D-マンニトール、酸化マグネシウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、エチルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日新製薬株式会社 (<https://www.yg-nissin.co.jp/>)

安全管理部

電話番号：023-655-2131

E-mail : d-info@yg-nissin.co.jp