

## デカドロンエリキシル 0.01%

## 【この薬は？】

|                |   |
|----------------|---|
| 販売名            | デカドロンエリキシル 0.01%<br>DECADRON Elixir 0.01% |
| 一般名            | デキサメタゾン<br>Dexamethasone                  |
| 含有量<br>(1mL 中) | 0.1mg                                     |

## 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、合成副腎皮質ホルモン剤（ステロイド）と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、炎症やアレルギー症状を改善、免疫の抑制などさまざまな働きがあり、多くの病気に用いられます。ただし、病気の原因そのものを治す薬ではありません。
- ・次の病気の人に処方されます。

## 内分泌疾患

慢性副腎皮質機能不全（原発性、続発性、下垂体性、医原性）、急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ）、副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症、ACTH 単独欠損症、特発性低血糖症、下垂体抑制試験

## リウマチ性疾患

関節リウマチ、若年性関節リウマチ（スチル病を含む）、リウマチ熱（リウマチ性心炎を含む）、リウマチ性多発筋痛、強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）

## 膠原病

エリテマトーデス（全身性及び慢性円板状）、全身性血管炎（高安動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症を含む）、多発性筋炎（皮膚筋炎）、強皮症

## 腎疾患

ネフローゼ及びネフローゼ症候群

## 心疾患

うっ血性心不全

## アレルギー性疾患

気管支喘息、喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含む）、薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹、中毒疹を含む）、血清病

## 血液疾患

紫斑病（血小板減少性及び血小板非減少性）、再生不良性貧血、白血病（急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含む）、溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の疑われるもの）、顆粒球減少症（本態性、続発性）

## 消化器疾患

潰瘍性大腸炎、限局性腸炎、重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期、スプルーを含む）

## 肝疾患

劇症肝炎（臨床的に重症とみなされるものを含む）、胆汁うっ滞型急性肝炎、慢性肝炎（活動型、急性再燃型、胆汁うっ滞型）（但し、一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る）、肝硬変（活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの）

## 肺疾患

サルコイドーシス（但し、両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く）、びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）

## 重症感染症

重症感染症（化学療法と併用する）

## 結核性疾患

肺結核（粟粒結核、重症結核に限る）（抗結核剤と併用する）、結核性髄膜炎（抗結核剤と併用する）、結核性胸膜炎（抗結核剤と併用する）、結核性腹膜炎（抗結核剤と併用する）、結核性心臓炎（抗結核剤と併用する）

## 神経疾患

脳脊髄炎（脳炎、脊髄炎を含む）（但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること）、末梢神経炎（ギランバレー症候群を含む）、筋強直症、重症筋無力症、多発性硬化症（視束脊髄炎を含む）、小舞蹈病、顔面神経麻痺、脊髄蜘蛛膜炎

## 悪性腫瘍

悪性リンパ腫（リンパ肉腫症、細網肉腫症、ホジキン病、皮膚細網症、菌状息肉症）及び類似疾患（近縁疾患）、好酸性肉芽腫、乳癌の再発転移

## 外科疾患

副腎摘除、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲、侵襲後肺水腫、臓器・組織移植、蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）、原因不明の発熱

## 産婦人科疾患

卵管整形術後の癒着防止

## 泌尿器科疾患

前立腺癌（他の療法が無効な場合）、陰茎硬結

## 皮膚科疾患

\*湿疹・皮膚炎群（急性湿疹、亜急性湿疹、慢性湿疹、接触皮膚炎、貨幣状湿疹、自家感作性皮膚炎、アトピー皮膚炎、乳・幼・小児湿疹、ビダール苔癬、その他の神経皮膚炎、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、その他の手指の皮膚炎、陰部あるいは肛門湿疹、耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎、鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など）（但し、重症例以外は極力投与しないこと）、\*痒疹群（小児ストロフルス、蕁麻疹様苔癬、固定蕁麻疹を含む）（但し、重症例に限る。また、固定蕁麻疹は局注が望ましい）、蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る）、\*乾癬及び類症〔尋常性乾癬（重症例）、関節症性乾癬、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、稽留性肢端皮膚炎、疱疹状膿痂疹、ライター症候群〕、\*掌蹠膿疱症（重症例に限る）、\*扁平苔癬（重症例に限る）、成年性浮腫性硬化症、紅斑症（\*多形滲出性紅斑、結節性紅斑）（但し、多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る）、IgA血管炎（重症例に限る）、ウェーバークリスチャン病、粘膜皮膚眼症候群〔開口部びらん性外皮症、ステブンス・ジョンソン病、皮膚口内炎、フックス症候群、ベーチェット病（眼症状のない場合）、リップシュッツ急性陰門潰瘍〕、レイノー病、\*円形脱毛症（悪性型に限る）、天疱瘡群（尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、Senear-Usher症候群、増殖性天疱瘡）、デューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡、妊娠性疱疹を含む）、先天性表皮水疱症、帯状疱疹（重症例に限る）、\*紅皮症（ヘブラ紅色剝離疹を含む）、顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例に限る）、アレルギー性血管炎及びその類症（急性痘瘡様苔癬状剝離疹を含む）、潰瘍性慢性膿皮症、新生児スクレレーマ

## 眼科疾患

内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜炎、網脈絡膜炎、網膜血管炎、視神経炎、眼窩炎性偽腫瘍、眼窩漏斗尖端部症候群、眼筋麻痺）、外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適當又は不十分な場合（眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎）、眼科領域の術後炎症

## 耳鼻咽喉科疾患

急性・慢性中耳炎、滲出性中耳炎・耳管狭窄症、メニエル病及びメニエル症候群、急性感音性難聴、血管運動（神経）性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症（枯草熱）、進行性壊疽性鼻炎、喉頭炎・喉頭浮腫、耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法、嗅覚障害、急性・慢性（反復性）唾液腺炎

## 歯科・口腔外科疾患

**難治性口内炎及び舌炎（局所療法で治癒しないもの）**

**〈注釈〉★印（適応の左肩）**

**★印の附されている適応に対しては、外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いることとされたものを示す。**

- ・この薬は、自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショックなどの症状があらわれることがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## **【この薬を使う前に、確認すべきことは？】**

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にデカドロンエリキシルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・ジスルフィラム製剤またはシアナミド製剤を飲んでいる人

○次の人は、原則として、この薬を使用することはできません。

- ・有効な抗菌剤のない感染症にかかっている人
- ・全身の真菌症にかかっている人
- ・消化性潰瘍のある人
- ・精神病の人
- ・結核にかかっている人
- ・単純疱疹性角膜炎の人
- ・後囊白内障の人
- ・緑内障の人
- ・高血圧の人
- ・電解質異常のある人
- ・血栓症の人
- ・最近、内臓の手術を受けた人
- ・急性心筋梗塞を起こした人
- ・コントロールが難しい糖尿病の人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・感染症にかかっている人
- ・糖尿病の人
- ・骨粗しょう症の人
- ・腎不全の人
- ・甲状腺機能が低下している人
- ・肝硬変の人
- ・脂肪肝の人
- ・脂肪塞栓症の人

- ・重症筋無力症の人
- ・高齢の人

○この薬には併用してはいけない薬〔ジスルフィラム（ノックビン）、シアナミド（シアナマイド）〕や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人は1日5～80mLを1～4回に分けて飲みます。小児は1日1.5～40mLを1～4回に分けて飲みます。

### ●どのように飲むか？

決められた1回量を計量カップ、スポイトなどではかり、飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついたときに、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を連用した後、急に飲むのを中止すると、発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショックなどがあらわれることがあります。中止する場合は徐々に減量されます。医師の指示どおりに飲んでください。
- ・B型肝炎ウイルスキャリアといわれている人は、この薬の使用後や使用終了後に継続して血液検査が行われます。発熱、倦怠感（けんたいかん）、皮膚や白目が黄色くなるなどの症状があらわれた場合には、速やかに医師に連絡してください。
- ・この薬を長期あるいは大量に使用している間、または使用中止後6ヵ月以内は、免疫機能が低下していることがありますので、生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふく風邪、水痘（みずぼうそう）、BCG、ポリオ（小児まひ）など〕の接種を受けないでください。
- ・水痘（みずぼうそう）または麻疹（はしか）に感染すると致命的な経過をたどることがあります。感染が疑われる場合はただちに受診してください。
- ・強皮症の人は、この薬の使用で強皮症腎クリーゼがあらわれやすくなるとの報告があります。使用中は血圧や腎機能検査が行われます。頭痛、むかむかする、嘔吐（おうと）、視力低下、けいれんなどの症状があらわれた場合には、速やかに医師に連絡してください。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用  | 主な自覚症状  |
|---|---|
| 誘発感染症、感染症の増悪<br>ゆうはつかんせんしょう、かんせんしょう<br>のぞうあく        | かぜのような症状、からだがだるい、発熱、嘔吐<br><br>〔B型肝炎ウイルスの増殖による肝炎としてあらわれる場合〕<br>吐き気、嘔吐、食欲不振、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる   |
| 続発性副腎皮質機能不全<br>ぞくはつせいふくじんひしつきのうふぜん                  | からだがだるい、吐き気、嘔吐、力が入らない、食欲不振、低血圧  |
| 糖尿病<br>とうりょうびょう                                     | のどが渇く、疲れやすい、尿量が多い、体重減少  |
| 消化性潰瘍<br>しょうかせいかいりょう                                | 腹痛、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振  |
| 消化管穿孔<br>しょうかかんせんこう                                 | 吐き気、激しい腹痛、嘔吐  |
| 膵炎<br>すいえん  | 胃・おなかの激しい痛み、吐き気、背中痛み、嘔吐   |
| 精神変調<br>せいしんへんちょう                                   | 気分が落ち込む、夜中に目がさめる、眠りが浅い、食欲不振、情緒不安、考えがまとまらない、気分がふさぎ込む、やる気がおきない、ぼんやりする、どうしたらよいかわからない、からだのだるい、上機嫌 |
| うつ状態<br>うつじょうたい                                     | やる気がおきない、気分が落ち込む、気分がふさぎ込む、不眠  |
| 痙攣<br>けいれん  | けいれん  |
| 骨粗しょう症<br>こつそしょうじょう                                 | 腰・背中痛み、骨折しやすくなる、手足の痛み   |
| 大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死<br>だいたいこつおよびじょうわんこつなどのこつとうむきんせいえし | 膝の関節の痛み、歩行障害、太もも前面の痛み、関節の痛み、歩くときや立ち上がる時の股関節の痛み  |
| ミオパシー<br>ミオパシー                                      | 筋肉のこわばり、筋力の低下、痛み  |

| 重大な副作用                      | 主な自覚症状  |
|-----------------------------|---|
| 脊椎圧迫骨折<br>せきついあっぱくこっせつ      | 腰・背中の痛み、足のしびれ・脱力・まひ   |
| 長骨の病的骨折<br>ちょうこつのはひょうてきこっせつ | 骨折した局所の痛みや腫れ、運動障害   |
| 緑内障<br>りょくないしょう             | 吐き気、眼の痛み、視力の低下、頭痛   |
| 後嚢白内障<br>こうのうはくないしょう        | 眼のかすみ、光がまぶしく感じる、視力の低下   |
| 血栓塞栓症<br>けっせんそくせんしょう        | 吐き気、血を吐く、腹がはる、嘔吐、胸の痛み、胸をしめつけられる感じ、激しい腹痛、出血、足の激しい痛み、知覚のまひ、胸を強く押さえつけた感じ |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位  | 自覚症状   |
|-----|--|
| 全身  | かぜのような症状、からだがだるい、力が入らない、けいれん、骨折しやすくなる、関節の痛み、痛み、発熱、疲れやすい、骨折した局所の痛みや腫れ、運動障害            |
| 頭部  | 考えがまとまらない、ぼんやりする、頭痛  |
| 眼   | 眼の痛み、視力の低下、眼のかすみ、光がまぶしく感じる、白目が黄色くなる  |
| 口や喉 | 吐き気、血を吐く、嘔吐、のどが渇く  |
| 胸部  | 吐き気、胸やけ、胸の痛み、胸をしめつけられる感じ、胸を強く押さえつけた感じ  |
| 腹部  | 吐き気、腹痛、食欲不振、激しい腹痛、胃・おなかの激しい痛み、腹がはる   |
| 背中  | 腰・背中の痛み、背中の痛み  |
| 手・足 | 手足の痛み、膝の関節の痛み、歩行障害、太もも前面の痛み、関節の痛み、歩くときや立ち上がるときの股関節の痛み、足の激しい痛み、足のしびれ・脱力・まひ            |
| 皮膚  | 皮膚が黄色くなる   |
| 筋肉  | 筋肉のこわばり、筋力の低下  |
| 尿   | 尿量が多い  |
| その他 | 気分が落ち込む、気分がふさぎ込む、やる気がおきない、どうしたらよいかわからない、夜中に目がさめる、眠りが浅い、不眠、情緒不安、上機嫌、低血圧、体重減少、知覚のまひ、出血 |

## 【この薬の形は？】

|    |   |
|----|---|
| 形状 | エリキシル剤<br> |
|    | 容量<br>250mL   |
| 色  | 赤色  |

## 【この薬に含まれているのは？】

|      |  |
|------|--|
| 有効成分 | デキサメタゾン                                  |
| 添加物  | グリセリン、エタノール (95)、安息香酸、サッカリンナトリウム、赤色2号、香料 |

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

日医工株式会社 (<http://www.nichiiko.co.jp>)

くすりの相談窓口の電話番号 TEL(フリーダイヤル)：(0120)517-215

受付時間：9時～17時（土、日、祝日その他当社の休業日を除く）