

## ブレオS軟膏 5mg/g

### 【この薬は？】

販売名	ブレオS軟膏 5mg/g Bleo・S Ointment 5mg/g
一般名	ブレオマイシン硫酸塩 Bleomycin Sulfate
含有量 (1g 中)	5mg (力価)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗腫瘍性抗生物質に属する軟膏です。
- ・この薬は、細胞のDNA（デオキシリボ核酸）鎖を切断したり、DNA合成を抑えてがん細胞の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 皮膚悪性腫瘍

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬により肺に間質性肺炎・肺線維症などの重篤な副作用があらわれ、ときに致命的な経過をたどることがあります。息苦しい、息切れ、咳、発熱の症状が認められた場合には、ただちに使用を中止し医師に連絡してください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・肺に重篤な障害、胸部レントゲン写真上明らかな異常がある人
  - ・過去にブレオマイシンやペプロマイシンで過敏症を経験したことのある人
  - ・腎臓に重篤な障害のある人
  - ・心臓に重篤な障害のある人
  - ・胸部及びその周辺部への放射線照射を受けている人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・過去に肺に障害があった人、または肺に障害のある人
  - ・胸部に放射線照射を受けたことのある人
  - ・心臓に障害のある人
  - ・水痘（みずぼうそう）にかかっている人
  - ・腎臓に障害のある人
  - ・肝臓に障害のある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない治療法（胸部及びその周辺への放射線療法）や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の使用前に胸部レントゲン検査や肺機能検査が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

	閉鎖密封療法*	閉鎖密封療法*が困難な場合
一回量	患部 $100\text{ cm}^2$ ( $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ ) あたり $1 \sim 2.5\text{ g}$	
使用回数	1日1回	1日2～3回

\*閉鎖密封療法（ODT）：軟膏を患部に塗り、その上にラップをのせてからカーゼ等で覆い、テープで固定する治療法。

### ●どのように使用するか？

- ・閉鎖密封療法で使用します。閉鎖密封療法が困難な場合は、単純塗布します。
- ・患部に塗る前によく手を洗い、塗り終わったらただちにその指をきれいに洗ってください。
- ・眼の周囲に塗る場合には眼に入らないように注意してください。

### ●使用し忘れた場合の対応

決して2回分を一度に塗らないでください。塗り忘れに気付いた時点ですぐに1回分塗ってください。

## ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・間質性肺炎・肺線維症（息苦しい、息切れ、咳、発熱）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止し受診してください。
- ・肺に疾患のある人や高齢の人は、肺の副作用があらわれる頻度が高いので、息苦しい、息切れ、咳、発熱の症状に特に注意してください。
- ・使用中および使用終了後の一定期間（およそ2ヶ月位）は定期的に肺機能検査が行われます。
- ・ペプロマイシンおよび他のブレオマイシン製剤の投与をうけたことがある場合は副作用が相加するおそれがあります。
- ・感染症（発熱、寒気、体がだるいなど）、出血傾向（歯ぐきからの出血、出血がとまりにくい、あおあざができる、鼻血など）の症状があらわれたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
- ・小児や生殖可能な年齢の人にこの薬を使用する場合には、性腺に対する影響を考慮して使用されます。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
間質性肺炎、肺線維症 かんしつせいはいえん、 はいせんいしょう	息苦しい、息切れ、咳、発熱

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱
口や喉	咳
胸部	息切れ、息苦しい

## 【この薬の形は？】

性状	無色～微黄色半透明の軟膏
内容量	5 g
容器の形状	

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分 (1 g 中)	ブレオマイシン硫酸塩 5 mg (力価)
添加物	ゲル化炭化水素

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本化薬株式会社 (<https://www.nipponkayaku.co.jp/>)

くすりの相談窓口

電話：0120-656-216

受付時間：9時～17時30分

（土・日・祝日及び弊社休業日を除く）