

患者向医薬品ガイド

2020年10月更新

モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」

【この薬は?】

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 Mosapride Citrate Tablets 2.5mg "Chemiphar"	モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」 Mosapride Citrate Tablets 5mg "Chemiphar"
一般名	モサプリドクエン酸塩水和物 Mosapride Citrate Hydrate	
含有量 (1錠中)	2.645mg (モサプリドクエン酸塩として2.5mg)	5.29mg (モサプリドクエン酸塩として5mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は?】

- ・この薬は、消化管運動機能改善剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、上部（胃・十二指腸）および下部（大腸）消化管の運動を促進し、機能を改善します。
- ・次の病気の人、または次の目的で処方されます。

慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐）

経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助

【慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐）に使用する場合】

- この薬は、体調がよくなつたと自己判断して服用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助に使用する場合】

- この薬は、自己判断で飲む量を減らしたりすると本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- 妊婦または妊娠している可能性のある人
- 授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

【慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐）に使用する場合】

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「ケミファ」
1回量	2錠	1錠
飲む回数	1日3回 食前または食後に飲む	

【経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助に使用する場合】

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「ケミファ」
1回量	8錠	4錠
飲む回数	経口腸管洗浄剤使用前後で2回飲む	

●どのように飲むか？

【慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐）に使用する場合】

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

【経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助に使用する場合】

経口腸管洗浄剤使用開始時はコップ1杯程度の経口腸管洗浄剤（約180mL）で飲み、経口腸管洗浄剤使用終了後は少量の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

【慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、恶心・嘔吐）に使用する場合】

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分をすぐに飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

【経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助に使用する場合】

指定された時間に飲み忘れた場合は、医師、看護師または検査技師に相談してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・劇症肝炎や重篤な肝臓の障害、黄疸がおこることがあります。これらの副作用について、十分に理解できるまで説明を受けてください。体がだるくなる（けんたい感）、食欲がなくなる、尿の色が濃くなる、白目が黄色くなるなどの症状があらわれたら使用を中止し、ただちに受診してください。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれるこれが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



重大な副作用	主な自覚症状
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がかゆくなる、急激に体重が増える、疲れやすい、体がだるい、力が入らない
頭部	急な意識の低下

部位	自覚症状
眼	白目が黄色くなる
口や喉	血を吐く、吐き気
腹部	お腹が張る、食欲不振
皮膚	皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる
便	便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）

【この薬の形は？】

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」
形状	フィルムコーティング錠	割線入り フィルムコーティング錠
		
直径	5.6mm	長径 9.1mm 短径 4.6mm
厚さ	2.9mm	3.6mm
重さ	71.2mg	140mg
色	白色	白色
識別コード	NCP 2.5	NC P5

【この薬に含まれているのは？】

販売名	モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミファ」
有効成分	モサプリドクエン酸塩	
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチル、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本ケミファ株式会社 (<https://www.chemiphar.co.jp/>)

安全管理部 おくすり相談室

電話：0120-47-9321 03-3863-1225

FAX:03-3861-9567

受付時間：8時45分～17時30分

(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)